

2013年5月(記載要領変更に伴う改訂)

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください
また必要なときに読めるよう大切に保管してください
使用期限(パッケージの側面に記載)を過ぎた製品は服用しないこと

へんとうせん

扁桃腺のはれ、のどの痛み

ハレナース[®]

販売名：ハレナース

口腔・咽喉用薬

第3類医薬品

特徴

- トラネキサム酸とカンゾウエキスの2つの抗炎症成分が、扁桃腺のはれを鎮めます
- 水なしでも飲めて、患部に気持ちいい冷感がとどきます

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
- 1.本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと
(1)甘草(カンゾウ)またはその主成分グリチルリチンを含有する内服薬
(むくみ、血圧上昇および筋疾患(ミオパチー)などが起きることがある)
 - (2)他のアレルギー用薬、トラネキサム酸を含有する内服薬
(鼻炎用薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮咳去痰薬など)
- 2.長期連用しないこと



相談すること

- 1.次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
(1)医師または歯科医師の治療を受けている人
(2)妊婦または妊娠していると思われる人
(3)高齢者
(4)薬などによるアレルギー症状を起こしたことがある人
(5)次の症状のある人：むくみ
(6)次の診断を受けた人
高血圧、心臓病、腎臓病、血栓のある人(脳血栓、心筋梗塞、血栓静脈炎など)、
血栓症を起こすおそれのある人
- 2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、胸やけ、食欲不振もしくは食欲増進、胃部不快感、胃部膨満感
精神神経系	めまい
その他	頻尿

まれに下記の重篤な症状が起こることがある
その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、 脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる

- 3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
下痢
4. 5～6日間服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

(裏面につづく)

効能・効果

扁桃炎（のどのはれ、のどの痛み）・咽頭炎、口内炎

用法・用量

次の量を朝昼晩に服用してください

年 齢	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	1包	3回
7才以上15才未満	1/2包	
7才未満	× 服用しないこと	

＜用法・用量に関連する注意＞

- （1）定められた用法・用量を厳守すること
 - （2）小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること
- 水なしでも服用できます

成分・分量

1日量（3包：3.9g）中

トラネキサム酸……………750mg
カンゾウエキス……………198mg（原生薬換算量990mg）
ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB₆）……………50mg
リボフラビン（ビタミンB₂）……………12mg
L-アスコルビン酸ナトリウム（ビタミンCナトリウム）……………500mg

添加物として、エリスリトール、アルファ化デンプン、二酸化ケイ素、タルク、カラメル、無水ケイ酸、L-メントール、香料を含有する

- 本剤の服用により、尿が黄色くなることがありますが、ビタミンB₂によるものですから心配ありません
- 本剤は天然物（生薬）を用いているため、顆粒の色が多少異なることがあります

有効成分のはたらき

トラネキサム酸	抗炎症作用があり、のどのはれ・痛みなどの症状を改善します
カンゾウエキス	主成分グリチルリチン酸の抗炎症作用で、のどのはれ・痛みなどを改善します
ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB ₆ ）	粘膜の機能を正常に働かせる作用があります
リボフラビン（ビタミンB ₂ ）	
L-アスコルビン酸ナトリウム（ビタミンCナトリウム）	体力消耗時のビタミンC補給になります

保管および取扱い上の注意

- （1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに保管すること
- （2）小児の手の届かないところに保管すること
- （3）他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる）
- （4）1包を分割し服用する場合、残った薬剤は袋の口を折り返して保管すること
また、保管した残りの薬剤は、その日のうちに服用するか捨てること

製品のお問合せは、お買い求めのお店またはお客様相談室にお願いいたします

発売元 **小林製薬株式会社**
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10
ホームページ <http://www.kobayashi.co.jp>

製品のお問合せ先（お客様相談室）
☎0120-5884-01
受付時間 9:00～17:00（土・日・祝日を除く）

製造販売元 **小林製薬株式会社**
〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

MADE IN JAPAN
1CD-13EA