

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください。また必要なときに読めるよう大切に保管してください。使用期限(パッケージ底面に記載)を過ぎた製品は服用しないこと

おなかのガスだまりに

**ガスピタン<sup>®</sup>**<sub>a</sub>

販売名：ガスピタン<sub>a</sub>

整腸薬 第3類医薬品

### 製品特徴

- 消泡剤(ジメチルポリシロキサン)が胃や腸内に発生したガスだまりをつぶし、おなかのガスだまり(膨満感)を改善します
- 3種類の乳酸菌(フェカリス菌、アシドフィルス菌、ビフィズス菌)が、おなかの調子を整えます
- 消化酵素(セルラーゼAP3)が食物繊維を分解し、ガスの発生を抑えます
- 噛み砕いても口の中で溶かしても服用できるチュアブルタイプなので、水なしで、服用することができます

### ⚠ 使用上の注意



#### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

(1) 医師の治療を受けている人

(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること  
下痢

4. 2週間くらい服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

## 効能・効果

整腸(便通を整える)、腹部膨満感、軟便、便秘

## 用法・用量

次の量を食前または食間にかみ砕くか口中で溶かして服用してください

年齢	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	1錠	3回
15才未満	× 服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

(1)定められた用法・用量を厳守すること

(2)本剤は必ず、かみ砕くか、または口中で溶かして服用すること

●食間とは「食事と食事の間」を意味し、食後約2～3時間のことをいいます

## 成分・分量 1日量(3錠)中

成分	分量	はたらき
ラクトミン(フェカリス菌)	24mg	小腸で増え、腸内菌を整える
ラクトミン(アシドフィルス菌)	54mg	小腸で乳酸をつくり有害菌を抑制
ビフィズス菌	24mg	大腸で乳酸と酢酸をつくり整腸効果を高める
セルラーゼAP3	180mg	食物繊維を分解し、ガスの発生を抑制
ジメチルポリシロキサン	180mg	腸内で発生したガスだまりをつぶし、膨満感を緩和

添加物として、ラクチール、セルロース、無水ケイ酸、クロスCMC-Na、ステアリン酸Mg、CMC-Na、香料を含有する

## 保管および取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに保管すること

(2)小児の手の届かないところに保管すること

(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)

<錠剤の取り出し方>

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用すること(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながる)



製品のお問合せは、お買い求めのお店またはお客様相談室にお願いいたします

発売元  
**小林製薬株式会社**  
〒541-0045 大阪府中央区道修町4-4-10

製品のお問合せ先(お客様相談室)  
☎0120-5884-01  
受付時間9:00~17:00(土・日・祝日を除く)  
ホームページ <http://www.kobayashi.co.jp>

製造販売元  
**明治薬品株式会社**  
〒939-3548 富山県富山市三郷6