



肩こり、筋肉痛

# アンメルツ ヨコヨコ

### ■ 保管及び取扱い上の注意 ■

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所（冷暗所）にキャップをしっかりとめて立てて保管すること
  - (2) 小児の手の届かない所に保管すること
  - (3) 他の容器に入れ替えないうこと（誤用の原因になったり品質が変わる）
- キャップをしっかりとめないで液が漏れることがある
  - プラスチック製品（眼鏡わく、くし、便座等）、化繊の衣類、木材（塗料塗り家具、床等）、皮革等に液がつくと消耗したり、シミになることがあるので注意すること

**火気厳禁** 第二石油類 危険等級Ⅲ  
エタノール含有物

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

**第3類医薬品** 82mL

**税 控除 対象**

POS標準  
倍率見本0.80倍  
4987072001264

4 987072 001264

使用に際して、この説明書きを必ずお読みください  
使用期限を過ぎた製品は使用しなご

販売名：アンメルツヨコヨコ  
External Anti-Inflammatory / Analgesic

**第3類医薬品** **外用鎮痛消炎剤**

### 特 徴

1. **とても塗りやすいタイプです**  
アンメルツヨコヨコは、容器の首の部分  
が曲がっているので、塗りにくい背中や腰  
の患部でも、薬液がにじみ出るラバー  
キャップがピッタリと接し、スムーズ  
に塗布することができます
2. **どこでもむらなく適量を  
塗布できます**  
ラバーキャップより適量の薬液がにじ  
み出しますので、どの患部でも必要な  
だけ、適量を塗布できます
3. **塗りごちのよい  
さわやかな薬剤です**

### ▲ 使用上の注意

**⊗ してはいけないこと**

（守らないと現在の症状が悪化したり、  
副作用が起こりやすくなる）

次の部位には使用しないこと

- (1) 目の周囲、粘膜等
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口

**■ 相談すること**

1 次の方は使用前に医師、薬剤師又は登録販  
売者に相談すること

薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2 使用後、次の症状があらわれた場合は副作  
用の可能性があるので、直ちに使用を中止し  
、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販  
売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、 痛み、熱感、ヒリヒリ感

3 5～6日間使用しても症状がよくならない  
場合は使用を中止し、この箱を持って医師、  
薬剤師又は登録販売者に相談すること

### ■ 成分・分量 100mL中 ■

サリチル酸メチル	5000mg
トメントール	5200mg
dl-カンフル	5200mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩	100mg
チモール	700mg
ノナン酸ニリルアミド	10mg

添加物として、プロピレングリコー  
ル、エタノール、フェニルエチルア  
ルコールを含有する

### ■ 効能・効果 ■

肩のこり、筋肉痛、神経痛、腰痛、  
打撲、筋肉のはれ、リウマチ、しもやけ

### ■ 用法・用量 ■

患部に適量を塗布してください

### <用法・用量に関連する注意>

- (1) 小児に使用させる場合には、保護  
者の指導監督のもとに使用すること
  - (2) 目に入らないように注意すること。万  
一、目に入った場合には、すぐに水又は  
ぬる湯で洗うこと。なお、症状が重い  
場合には、眼科医の診察を受けること
  - (3) 外用にのみ使用すること
- 塗布部位をラップフィルム等の通気  
性の悪いもので覆わないこと
  - 皮膚の特に弱い方は、同じ所に続け  
て使用しないこと
  - スポーツや入浴等、汗をかく前・後  
に使用した場合、ヒリヒリとした刺激、痛み  
や熱感が増すことがあります。これらの  
症状が強い場合は、石鹸で洗い流す  
と緩和します



製品の問合せは、お買い求めのお店  
又はお客様相談室にお願いいたします

▼ ありがたいな/をカタチにする

発売元 小林製薬株式会社  
〒541-0045 大阪府中央区道徳町4-4-10

小林製薬 お客様相談室

0120-5884-01

9:00～17:00 (土・日・祝日を除く)

製造販売元 小林製薬株式会社  
〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

MADE IN JAPAN