

成分・分量 100mL中

サリチル酸グリコール 2500mg
l-メントール 3000mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩 100mg
ニコチン酸ベンジルエステル 10mg
ノナン酸バニリルアミド 12mg
添加物として、プロピレングリコール、エタノール、ハアセチルショ糖を含有する

効能・効果

肩こり、筋肉痛、筋肉疲労、腰痛、打撲、捻挫、関節痛

用法・用量

1日数回患部に適量を塗布してください

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること
- (2) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること
- (3) 外用にのみ使用すること

●塗布部位をラップフィルムなどの通気性の悪いもので覆わないこと●皮ふの特に弱い人は、同じところに続けて使用しないこと●ヒリヒリとした刺激が強い場合は、石けんで洗い流すと緩和します



製品のお問合せは、お買い求めのお店またはお客様相談室にお願いいたします

発売元
小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10
製品のお問合せ先(お客様相談室)
☎0120-5884-01
受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)
ホームページ | <http://www.kobayashi.co.jp>

製造販売元
小林製薬株式会社
〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

MADE IN JAPAN

無臭性



NEW
肩こり、筋肉痛に

NEW

アンメルツ

ヨコヨコA

鎮痛成分+血行促進成分

サリチル酸グリコール ノナン酸バニリルアミド



イメージ図

第3類医薬品

80mL

NEW

アンメルツ

ヨコヨコA

第3類医薬品

保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところ(冷暗所)にキャップをしっかりとめて立てて保管すること
- (2) 小児の手の届かないところに保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 火気に近づけないこと(エタノール含有物)

- キャップをしっかりとめないで液が漏れることがある
- プラスチック製品(眼鏡わく、くし、便座など)、化繊の衣類、木材(塗料塗り家具、床など)、皮革などに液がつくと損耗したり、シミになることがあるので注意すること

副作用被害救済制度
☎0120-149-931

使用に際して、この説明書きを必ずお読みください
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください
使用期限(パッケージ底面および容器底面に記載)を過ぎた製品は使用しないこと

販売名:ニューアンメルツヨコヨコA 第3類医薬品
External Anti-Inflammatory / Analgesic

外用消炎鎮痛剤

特徴

1. **つらい肩こり、筋肉痛に効きます**
ニューアンメルツヨコヨコAは有効成分に、ニコチン酸ベンジルエステルを配合。すぐれた効きめで、つらい肩こりや筋肉痛を治癒していきます
2. **無臭性です**
消炎鎮痛剤特有の臭いがほとんどありません。いままで人前で臭いが気になっていた人や、臭いに敏感な人でも安心して塗布できます
3. **塗りやすいボトルです**
持ちやすく、塗りやすい機能的な容器です。首の部分が曲がっていて、ラバーキャップがピッタリと接します。背中や腰など塗りにくい患部でも、極めてスムーズにむらなく適量を塗布できます

★塗布したあと、入浴や運動などをしますと、強い刺激(ヒリヒリするなど)を感じる場合があります。これは、ニューアンメルツヨコヨコAの有効成分が患部に作用しているためです。刺激が強すぎる時は、石けんで洗い流すと刺激は緩和します

使用上の注意

× してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないこと
(1) 目の周囲、粘膜など (2) 湿疹、かぶれ、傷口

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、このパッケージを持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、痛み

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、このパッケージを持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること