

使用に際して、この説明書を必ずお読みください
また必要なときに読めるよう大切に保管してください

使用期限（パッケージ底面およびボトル裏面に記載）を過ぎた製品は
使用しないこと

コンタクトレンズをはずした後に

アイボン^c

Eyewash 洗眼薬

コンタクトレンズを使用していると、目の異物感、かゆみ
など不快な症状がおこりがちです。目についてのタンパク
汚れやほこりを洗い流して、スッキリとさせます

販売名：アイボン^c

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(3) 次の症状のある人
はげしい目の痛み
(4) 眼球乾燥症候群(ドライアイ**)の診断を受けた人
**医師から病名として診断を受ける程度の人を前提としています
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がある
ので、直ちに使用を中止し、このパッケージを持って医師、
薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

効能・効果

目の洗浄、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）

用法・用量

1日3～6回、1回5mLを用いて洗眼してください

(用法・用量に関連する注意)

- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること
- コンタクトレンズを装着したまま使用しないこと
また再装着する場合は、洗眼してから10～15分程度あけること
- 洗眼カップは使用前後に水道水で十分に洗浄すること
- 混濁したものは使用しないこと
- 洗眼用にのみ使用すること

成分・分量 100mL中

成分	分量	はたらき
イブシロン-アミノカブロン酸	200mg	抗炎症作用
グリチルリチン酸二カリウム	10mg	抗炎症作用
クロルフェニラミンマレイン酸塩	3mg	抗ヒスタミン作用
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)	10mg	代謝促進作用
トコフェロール酢酸エステル	5mg	血行促進作用
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	40mg	角膜保護作用

添加物として、ホウ酸、ホウ砂、ポリソルベート80、エデト酸Na、
トメントール、d-ボルネオール、pH調整剤を含有する

保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しいところにキャップをしっかりとめて
箱に入れて保管すること
 - (2) 小児の手の届かないところに保管すること
 - (3) 他の容器に入れ替えないこと
(誤用の原因になったり品質が変わる)
 - (4) 洗眼カップは他の人と共用しないこと
- 副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

第3類医薬品

使い方


- コンタクトレンズを装着されている場合は、使用前に
必ずコンタクトレンズをはずすこと
- 使用前に目のまわりの化粧や汚れはきれいにふき
とること
- 洗眼カップは使用前後に水道水で充分洗浄すること
- 保存状態によって容器の口周辺に白い結晶が付着
することがあるので、その場合は清潔なガーゼ等で
軽くふきとること
- コンタクトレンズを使っていない人も使用できます




- ① 本剤を添付洗眼カップ
の内側の線(5mL)まで
入れ、



- 目にぴったりと押し当
ててください



- ② 次にカップを目に押
し当てたまま、液がこ
ぼれないように頭を後
ろへそらし、上を向き、



- 数回まばたきをして洗
眼してください

- 片方の目を洗った液
で反対側の目を洗わな
いください
- 30秒以上洗眼しな
いください



製品のお問合せは、お買い求めのお店または
お客様相談室にお願いいたします



発売元

小林製薬株式会社

〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

製品のお問合せ先(お客様相談室)

☎ 0120-5884-01

受付時間9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

ホームページ <http://www.kobayashi.co.jp>

製造販売元

小林製薬株式会社

〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

MADE IN JAPAN

※防腐剤とはベンザルコニウム塩化物、パラベン等の
ことを指します