



## 外用消炎鎮痛剤

痛い腰、肩、ひざに

## アンメルシン1%ヨコヨコ ヒロビロ



## 特徴

- 1.** 腰、肩、ひざの痛みに優れた効き目を発揮する塗り薬です
- 2.** ラバ一面積が4倍(当社比)手を汚さず、効き目成分を一度でたっぷり塗れます
- 3.** 有効成分インドメタシンが皮ふからすばやく浸透し、関節の痛みを和らげます

(原寸大)

## 第2類医薬品

使用に際して、この説明書きを必ずお読みください  
また必要なときに読めるよう大切に保管してください  
使用期限(パッケージ底面および容器底面に記載)  
を過ぎた製品は使用しないこと

販売名：アンメルシン1%ヨコヨコ  
(External Anti-Inflammatory / Analgesic Containing Indometacin) 外用消炎鎮痛剤

## △ 使用上の注意

## ☒ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
1. 次の人は使用しないこと
    - (1) 本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
    - (2) ぜんそくを起こしたことがある人
  2. 次の部位には使用しないこと
    - (1) 目の周囲、粘膜など
    - (2) 湿疹、かぶれ、傷口
    - (3) みずむし・たむしなど、または化膿している患部
  3. 長期連用しないこと

## 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 妊婦または妊娠していると思われる人
  - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、このパッケージを持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症 状                           |
|------|-------------------------------|
| 皮 ふ  | 発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感 |

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、このパッケージを持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

製品のお問合せは、お買い求めのお店またはお客様相談室にお願いいたします



発売元

小林製薬株式会社

〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

製品のお問合せ先(お客様相談室)

☎ 0120-5884-01

受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

ホームページ <http://www.kobayashi.co.jp>

製造販売元

小林製薬株式会社

〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3



4 987072 077597

MADE IN JAPAN

## 成分・分量 100mL中

|   |        |
|---|--------|
| インドメタシン   | 1000mg |
| I-メントール   | 3000mg |
| 添加物として、グリチルレチン酸、ベンジルアルコール、ラウロマクロゴール、炭酸プロピレン、pH調整剤、BHT、ハーゼチルショ糖、エタノールを含有する |        |

## 効能・効果

関節痛、腰痛、打撲、捻挫、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、肩こりに伴う肩の痛み

## 用法・用量

1日4回を限度として患部に適量塗布してください

## &lt;用法・用量に関する注意&gt;

- (1) 11歳以上のお子様に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用されること
- (2) 11歳未満のお子様に使用させないこと
- (3) 目に入らないように注意すること
 

万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗うこと  
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること
- (4) 外用にのみ使用すること
- (5) 1週間あたり50mLを超えて使用しないこと
  - 塗布部位をラップフィルムなどの通気性の悪いもので覆わないこと
  - 皮ふの特に弱い人は、同じところに続けて使用しないこと
  - 同じ部位に他の外用剤を併用しないこと

## 保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところ(冷暗所)にキャップをしっかりと立てて保管すること
- (2) 小児の手の届かないところに保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 火気に近づけないこと(エタノール含有物)
  - キャップをしっかりとしめないと液がもれることがある
  - プラスチック製品(眼鏡わく、くし、便座など)、化織の衣類、木材(塗料塗り家具、床など)、皮革などに液がつくと損耗したり、シミになることがあるので注意すること
  - 衣類に付着した場合には、各衣類の洗濯表示に従って、すみやかに洗うこと

## 火気厳禁

第二石油類 危険等級Ⅲ  
エタノール含有物

紙：箱 ラベル  
ボトル：キャップ

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931