

辛夷清肺湯「チクナイン」「チクナイン錠」の使用上の注意改訂のお知らせ

平素より弊社製品をご愛顧いただき、厚くお礼申し上げます。

この度、平成25年8月6日付け【「使用上の注意」の改訂について】(薬食安発0806第1号厚生労働省医薬食品局安全対策課長)の通知が発出されました。

これに伴い、該当の弊社製品「チクナイン」および「チクナイン錠」において、使用上の注意の一部を下記の通り改訂(追記)いたします。

つきましては、今後のご使用に際して、ご参照いただくとともに、ご不明な点がございましたら、弊社お客様相談室まで、お問合せ下さいますようお願い申し上げます。



なお、使用上の注意を改訂(追記)した製品がお手元に届くまでには流通在庫の関係からお時間を要する場合もございますのでご了承お願いいたします。

【弊社お客様相談室】 電話:0120(5884)01 受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

記

1. 「使用上の注意」の改訂(追記)内容(下線部)

使用上の注意「相談すること」の項に下記のとおり改訂(追記)する

改訂後	←	改訂前																						
 <p>相談すること</p>		 <p>相談すること</p>																						
<p>2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">関係部位</th> <th>症 状</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">消化器</td> <td style="text-align: center;">食欲不振、 胃部不快感</td> </tr> </tbody> </table> <p>まれに下記の重篤な症状が起こることがある その場合は直ちに医師の診療を受けること</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">症状の名称</th> <th>症 状</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>間質性肺炎</td> <td>* 症状については右記参照</td> </tr> <tr> <td>肝機能障害</td> <td>* 症状については右記参照</td> </tr> <tr> <td><u>腸間膜静脈硬化症</u></td> <td><u>長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満などが繰り返しあらわれる</u></td> </tr> </tbody> </table>	関係部位	症 状	消化器	食欲不振、 胃部不快感	症状の名称	症 状	間質性肺炎	* 症状については右記参照	肝機能障害	* 症状については右記参照	<u>腸間膜静脈硬化症</u>	<u>長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満などが繰り返しあらわれる</u>		<p>2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">関係部位</th> <th>症 状</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">消化器</td> <td style="text-align: center;">食欲不振、 胃部不快感</td> </tr> </tbody> </table> <p>まれに下記の重篤な症状が起こることがある その場合は直ちに医師の診療を受けること</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">症状の名称</th> <th>症 状</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>間質性肺炎</td> <td>階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱などがみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする</td> </tr> <tr> <td>肝機能障害</td> <td>発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振などがあらわれる</td> </tr> </tbody> </table>	関係部位	症 状	消化器	食欲不振、 胃部不快感	症状の名称	症 状	間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱などがみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする	肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振などがあらわれる
関係部位	症 状																							
消化器	食欲不振、 胃部不快感																							
症状の名称	症 状																							
間質性肺炎	* 症状については右記参照																							
肝機能障害	* 症状については右記参照																							
<u>腸間膜静脈硬化症</u>	<u>長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満などが繰り返しあらわれる</u>																							
関係部位	症 状																							
消化器	食欲不振、 胃部不快感																							
症状の名称	症 状																							
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱などがみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする																							
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振などがあらわれる																							

以上