

服用に際しては、この説明文をよく読むこと。

パスピタンDX(ビタミンB₁主薬製剤)
使用上の注意[相談すること] 1.服用後、次の
症状があらわれた場合は副作用の可能性があ
るので、直ちに服用を中止し、この製品を持っ
て医師、薬剤師または登録販売者に相談する
こと/皮ふ:発疹/消化器:吐き気・嘔吐・
胃部不快感 2.服用後、次の症状があらわれ
ることがあるので、このような症状の持続ま
たは増強がみられた場合には、服用を中止し、
この製品を持って医師、薬剤師または登録
販売者に相談すること/軟便、下痢 3.1ヵ月
位服用しても症状がよくなる場合は服用を
中止し、この製品を持って医師、薬剤師または
登録販売者に相談すること 成分・分量 1日
量[100mL(50mL×2本)]中 ペンフォチアミン
(ビタミンB₁誘導体)100mg、リボフラビンリン
酸エステルナトリウム(ビタミンB₂)12mg、ピリ
ドキシン塩酸塩(ビタミンB₆)50mg、ニコチン
酸アミド60mg、オキソアミチン末(加工大蒜)
200mg、コンドロイチン硫酸ナトリウム900mg
添加物:クエン酸、液糖、ハチミツ、D-ソルビ
トール、還元麦芽糖水アメ、香料(エタノール)

●ビタミンB₂により尿が黄色くなることがある。
効能・効果 ○次の諸症状の緩和:神経痛、
筋肉痛、関節痛(腰痛、肩こり、五十肩など)、
手足のしびれ、便秘、眼精疲労○脚気[ただし、
これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても
改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に

副作用被害救済制度

0120-149-931

金属:キャップ ガラス:びん

055511

KSD404

肩こり・眼精疲労に！

常盤薬品

NOEVIR GROUP

パスピタンDX
コンドロイチン・ビタミンB₁ 配合

目



肩



腰



第3類医薬品 50mL

相談すること。]

○次の場合のビタミンB₁
の補給:肉体疲労時、妊
娠・授乳期、病中病後の
体力低下時 用法・用量
成人(15才以上)1日2回、
1回1びん(50mL)を服用
すること。<用法・用量
に関連する注意>用法・
用量を守ること。保管お
よび取扱い上の注意 (1)
直射日光の当たらない涼
しい所に保管すること。
(2)小児の手のとどかな
い所に保管すること。(3)
他の容器に入れかえない
こと。(誤用の原因になつたり品質が変わる。)
(4)期限を過ぎた製品は服用しないこと。(5)
生薬を含むため、まれに混濁を生じることが
ありますが、服用には支障はありません。

製造販売元

常盤薬品工業株式会社
大阪市中央区安土町3-5-12

NOEVIR GROUP

お問い合わせは0120-875-710まで
www.tokiwayakuhin.co.jp

使用期限

製造番号

