



使用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。  
必要なときに読めるように、大切に保管してください。

がんがんめぐすり

第2類医薬品

# 眼目薬

眼目薬は、添加物としてトメントール、dl-カンフル(清涼化剤)を配合することで、清涼感のあるさし心地を実現しました。また、6種類の有効成分が疲れた目に作用し、かゆみをしずめ、充血をおさえます。

お仕事、受験勉強時にシャキッと爽快、眼目薬をお使いください。



## 使用上の注意



### 相談すること

#### 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 次の症状のある人。  
はげしい目の痛み
- (4) 次の診断を受けた人。  
緑内障

#### 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症状        |
|------|-----------|
| 皮膚   | 発疹・発赤、かゆみ |
| 目    | 充血、かゆみ、はれ |

#### 3. 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

- (1) 目のかすみ改善されない場合。
- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合。

## 効能・効果

○目の疲れ、結膜充血、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、眼瞼炎（まぶたのただれ）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ（目やにの多いときなど）

## 用法・用量

1回1～3滴、1日3～6回点眼してください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。  
[汚染や異物混入(目やにやホコリなど)の原因となります]  
また、混濁したものは使用しないでください。
- (5) ソフトコンタクトレンズの装着液として、また、ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (6) 点眼用にのみ使用してください。
- (7) 強い刺激を感じた場合は、使用をお控えください。



## 成分・分量 100mL中

| 成 分                         | 分 量     | はたらき                          |
|-----------------------------|---------|-------------------------------|
| 塩酸テトラヒドロソリン                 | 20mg    | 血管を収縮させて、目の充血をおさえます。          |
| ネオスチグミンメチル硫酸塩               | 5mg     | ピント調節機能に作用して、目の疲れを改善します。      |
| アラントイン                      | 100mg   | 抗炎症作用により、眼病を予防します。            |
| グリチルリチン酸二カリウム               | 100mg   |                               |
| クロルフェニラミンマレイン酸塩             | 30mg    | 抗ヒスタミン作用により、目のかゆみや充血をおさえます。   |
| Ｌ-アスパラギン酸マグネシウム・カリウム(等量混合物) | 1,000mg | 目の細胞の呼吸を盛んにして、疲れた目の機能を改善させます。 |


添加物：ホウ酸、pH調節剤（クエン酸）、ｌ-メントール、ｄ-カンフル、ポリソルベート80、プロピレングリコール、エドト酸Na、クロロブタノール、ベンザルコニウム塩化物

### <成分・分量に関連する注意>

点眼後、口の中に甘味を感じることがありますが、成分のグリチルリチン酸二カリウムが涙道を通して口の中に流れ出てくることによるもので、品質などの異常によるものではありません。

### 保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど、高温の場所に放置しないでください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、期限内であっても一度開封した後は、なるべく早く使用してください。
- (6) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側に白くつくことがあります。その場合には清潔なガーゼで軽くふきとって使用してください。
- (7) 容器に他のものを入れて使用しないでください。




### キャップの開閉方法

必ずキャップを上にし、容器の側面をもって開閉してください。

（容器の中心を押さえたまま開封すると薬液がとびでることがありますので、ご注意ください。）

#### ○あけ方

キャップを手前にひねってください。



#### ○しめ方

カチッと音がするまで押し下げてください。



### <お問い合わせ先>

本品に関してのお問い合わせは、お買い求め先または下記までご連絡ください。

常盤薬品工業株式会社

お客さま相談室 ☎ 0120-875-710まで

受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

www.tokiwayakuhin.co.jp

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

（独）医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

☎ 0120-149-931

### 発 売 元

常盤薬品工業株式会社  
大阪府中央区安土町3-5-12

NOEVIR GROUP

### 製造販売元

**テイカ製薬株式会社**  
富山市荒川一丁目3番27号