

第2類医薬品

服用に当たって、この説明書を必ずお読みください。
必要なときに読めるように、大切に保管してください。

ルックエス鼻炎カプセル(鼻炎用内服薬)

鼻炎は、大きく二つに分けることができます。ひとつは鼻かぜと言われる「急性鼻炎」、もう一つは花粉、ほこり、カビ、ダニ、動物の毛が原因となっておこる「アレルギー性鼻炎」です。

ルックエス鼻炎カプセルは、消炎酵素剤の塩化リゾチームをはじめ、抗ヒスタミン剤のマレイン酸クロルフェニラミン、鼻粘膜の充血、腫れをしずめる塩酸ブソイドエフェドリン、抗炎症剤のグリチルリチン酸モノアンモニウムなどを配合したカプセルタイプの鼻炎薬です。鼻みず、鼻づまり、くしゃみなど鼻炎による不快な症状にすぐれた効果をあらわします。カプセルはやや小型のホワイトカプセルで服用しやすく、服用量を調整することにより小児(7才以上)から服用できるようになっています。

特長

- 消炎酵素 塩化リゾチーム配合
- 抗炎症剤 グリチルリチン酸モノアンモニウム配合
- 血管収縮作用のある交感神経興奮剤 塩酸ブソイドエフェドリン配合
- 小児(7才以上)から服用可能
- 小型のホワイトカプセルで飲みやすい

使用上の注意

ⓧ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと

- (1)本剤又は鶏卵によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2)次の症状のある人。 前立腺肥大による排尿困難
- (3)次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、甲状腺機能障害、糖尿病

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと

他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)、塩酸フェニルプロパノールアミンを含有する内服薬(かぜ薬、鎮咳去痰薬)

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと(眠気があらわれることがある。)

4. 長期連用しないこと

ⓧ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3)高齢者。
- (4)本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (5)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (6)次の症状のある人。 高熱、排尿困難、むくみ
- (7)次の診断を受けた人。 緑内障、腎臓病
- (8)モノアミン酸化酵素阻害剤(塩酸セレギリン等)で治療を受けている人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい、不眠、神経過敏
そ の 他	排尿困難

まれに下記の高篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しき等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

(2)5~6日間服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること
□のかわき

効能又は効果

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：くしゃみ、鼻みず(鼻汁過多)、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭重(頭が重い)

用法及び用量

食後なるべく30分以内に服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	2カプセル	3回
7才以上15才未満	1カプセル	
7才未満	服用しないでください。	

〈用法及び用量に関連する注意〉

- (1)用法及び用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)カプセルの取り出し方
右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。(誤ってそのまま飲み込んだりしますと食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



成分及び分量 1日量(6カプセル)中

成 分	分 量	は た ら き
マレイン酸クロルフェニラミン	12mg	鼻に起こる炎症をやわらげ、鼻みず、鼻づまり、なみだ目を抑えます。
塩酸ブソイドエフェドリン	180mg	鼻粘膜の血管を収縮して、充血、腫れをしずめます。
グリチルリチン酸モノアンモニウム	55mg	消炎作用により、鼻みず、鼻づまりを抑えます。
塩化リゾチーム	60mg	粘膜や膿を分解し、鼻のとおりをよくします。
無水カフェイン	120mg	脳の血管に働いて、鼻づまりからくる頭重感をやわらげます。

添加物として、乳糖、硬化油、ゼラチン、酸化チタン、ラウリル硫酸Naを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手のとどかない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れかえないこと。
(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)期限を過ぎた製品は服用しないこと。

お問い合わせは
常盤薬品工業株式会社
お客さま相談室 ☎0120-875-710まで
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)
www.tokiwayakuhin.jp

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html
☎0120-149-931

製造販売元

常盤薬品工業株式会社
大阪市中央区安土町3-5-12
NOEVIR GROUP
常盤薬品はノエビアグループです。