

温感
タイプ

無臭
タイプ

ロイヒフェルビ温

テープ剤
第2類医薬品

8枚入

温感
タイプ

無臭
タイプ

ロイヒフェルビ温

テープ剤
第2類医薬品

4 987167 059491

NICHIBAN

温感タイプ 無臭タイプ

8枚入

ROIHI-FELBION

ロイヒフェルビ温

つらい痛みに
フェルビナク35mg配合

痛みのもとに直接作用

肩の痛み・腰痛・関節痛・筋肉痛・腱鞘炎

貼りやすい!!

ウィングセパレーター構造

第2類医薬品 テープ剤

8枚入

テープ剤
第2類医薬品

ロイヒフェルビ温

無臭
タイプ

温感
タイプ

この部分を
引き上げてください。

第2類医薬品

8枚入 品番RF8

販売名 ロイヒフェルビ温

特長

- ロイヒフェルビ温[®]は、非ステロイド系の鎮痛消炎成分フェルビナクを1枚あたり35mg配合したテープ剤です。
- フェルビナクは痛みの関連物質(プロスタグランジン)の生成を抑え、肩・腰・関節・筋肉のつらい痛みにすぐれた効果をあらわします。
- ここちよい温感タイプです。

- 無臭タイプで、人前でも臭いが気になりません。
- 貼りやすいウィングセパレーターを採用しています。セパレーターの中央を開くと翼のように広がり、セパレーターを左右にはかす際の取っ手になります。ひとりでも貼りやすい形状です。
- 基布が伸縮性にすぐれているので、肌によくフィットします。

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
1. 次の人は使用しないでください
 - (1) 本剤によるアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
 - (2) ぜんそくを起こしたことがある人。
 - (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (4) 15歳未満の小児。
 2. 次の部位には使用しないでください
 - (1) 目の周囲、粘膜等。
 - (2) 湿疹、かぶれ、キズ等。
 - (3) かゆみ、むしり、たむし等又は化膿している患部。
 3. 連続して2週間以上使用しないでください。

● 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (3) 薬や化粧品等によりアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用があるため、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 皮膚 発疹・発赤、かゆみ、はれ、痛み、ヒリヒリ感、水疱等

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、痛み、ヒリヒリ感、水疱等
症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の障害等があらわれます。

3. 5～6日間使用しても症状の改善が見られない場合は、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

その他の注意

入浴する場合は、貼った場所がヒリヒリする場合があるので、必ず30分以上前にはがしてください。また、入浴後は30分以上経過してからご使用ください。

ニチバン株式会社

〒112-8668 東京都文京区関口2-3-3
http://www.nichiban.co.jp/

日本製 MADE IN JAPAN

※は登録商標です。

効能・効果

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手指・足首の痛みとは別)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

用法・用量

表面のセパレーター(フィルム)をはがし、1日2回を限度として患部にお貼りください。

- 用法・用量に関する注意
- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
 - (2) 本剤は、痛みやはれ等の原因となっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用してください。
 - (3) 汗をかいた後や皮膚がぬれている場合は、よく拭き取ってからお貼りください。
 - (4) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側に1cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が現れないことを確かめてから使用してください。
 - (5) 皮膚の弱い人は、同じところに続けて貼らないでください。
 - (6) 発熱するもの(コタツ、ホットカーペット、カイロ、電気毛布等)と併用しますと、刺激が強くなる場合がありますので、ご注意ください。

成分・分量

成分・分量(膏体100g中)：たれ膏体質量は1g/1枚)
フェルビナク・・・3.5g

添加物として、流動パラフィン、ステレン・インソレン・ステレンブロック重合体、トルペン樹脂、ジブチルビドロキシルエソ、香料(ノニル炭ワリルアミド)を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (2) 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (3) 賞用をさけ、品質を保持するため未使用分は元の袋に入れて、閉封口をきちんと折り曲げて保管してください。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

包装 7cm×10cm・・・8枚

本品についてのお問い合わせは、お買い求めの販売店、又は下記にお願いします。

ニチバン株式会社 お客様相談室 ☎0120-377218
受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00(土日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先:

(株)医薬品医療機器総合機構 ☎0120-149931

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html

〔B14A03〕

温感
タイプ

無臭
タイプ

ロイヒフェルビ温

8枚入

製造番号 使用期限