

パンシロン胃腸内服液

第3類医薬品

〈使用上の注意〉

相談すること

服用に際しては記載事項を良くお読み下さい。

1. 医師の治療を受けている人は、服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談下さい。
2. 2週間くらい服用しても症状が良くならない場合は服用を中止し、本剤を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談下さい。

〈効能・効果〉

はきけ(二日酔・悪酔のむかつき、胃のむかつき、悪心)、飲みすぎ、胸やけ、胸つかえ、嘔吐、胃もたれ、食欲不振、消化不良、食べすぎ、胃弱、胃部・腹部膨満感

〈成分・分量〉1瓶(30mL)中

カンゾウエキス 75mg(原生薬換算量300mg)、ニンジンドライエキス15mg(原生薬換算量225mg)、キジツエキス50mg(原生薬換算量250mg)、チンピエキス50mg(原生薬換算量250mg)、ケイヒチンキ 0.25mL(原生薬換算量50mg)、オウレン流エキス0.15mL(原生薬換算量150mg)、ゲンチアナ流エキス0.1mL(原生薬換算量100mg)、カルニチン塩化物 75mg 添加物としてショウジ油、センプリエキス、L-メントール、アルギン酸プロピレングリコールエステル、白糖、D-ソルビトール、パラベン、安息香酸Na、エタノール、クエン酸Naを含有します。

ロート製薬 お客さま安心サポートデスク

TEL:06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

飲みすぎ・二日酔いのムカムカに

パンシロン[®]
胃腸内服

生薬配合

液

天然生薬
エキスの
効き目

第3類医薬品

30mL
ROHTO[®]

〈用法・用量〉

15才以上1回1瓶を1日2回服用して下さい。服用間隔は4時間以上あけて下さい。なお、15才未満の方は服用しないで下さい。

※本剤は生薬成分を配合しているため、まれに沈澱を生じることがありますが、品質に影響はありません。よく振ってから服用して下さい。

〈保管及び取扱上の注意〉

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。なお、使用期限内であっても、一度開封したあとはなるべく早くご使用下さい。

発売元

ロート製薬株式会社

大阪市生野区箕西1-8-1

製造販売元

滋賀県製薬株式会社

滋賀県甲賀市甲賀町湯879

6K2

使用期限

製造番号

