

制酸薬（分包品）

日本薬局方

第3類医薬品

# 炭酸水素ナトリウム

（重曹）

Sodium Bicarbonate

## 【使用上の注意】



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 腎臓病の診断を受けた人。

2. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 【効能効果】

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部膨満感、もたれ、胃重、胸つかえ、げっぷ、はきけ（むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心）、嘔吐、飲みすぎ、胃痛

## 【用法用量】

大人（15歳以上）1回 $\frac{1}{3}$ 包を1日3回食前又は食間に服用してください。

### 〈用法用量に関連する注意〉

用法用量を厳守してください。

## 【成分分量】

1包（1日量）中 日局炭酸水素ナトリウム 3g含有

## 【保管及び取扱

### い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

### 〈貯法〉

気密容器。室温保存。

## 【包装】

3g×12包