

外用殺菌消毒薬

日本薬局方

第3類医薬品

希ヨードチンキ

Dilute Iodine Tincture

【使用上の注意】



注 意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の部位には使用しないでください

粘膜（口唇等）、口の中、目の周囲、化膿している患部

3. 本剤を使用している間は、次の医薬品を使用しないでください

マーキュロクロム液

4. 広範囲又は長期連用しないでください

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(3) 患部が広範囲の人。

(4) 深い傷やひどいやけどの人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、灼熱感、水ぶくれ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。

その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
アナフィラキシー様 症状	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ等があらわれる。

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効 能 効 果】

創傷面の殺菌・消毒

【用 法 用 量】

適量を1日数回患部に塗布してください。

〈用法用量に関連する注意〉

(1) 用法用量を厳守してください。

(2) 患部及び皮膚に軽く塗るだけにとどめ、ガーゼ、脱脂綿等に浸して貼付しないでください。

(3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

(4) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。

(5) 外用にのみ使用してください。

【成 分 分 量】

100mL中 ヨウ素3g含有

添加物：ヨウ化カリウム、エタノール

- 【保管及び取扱い上の注意】**
- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
 - (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
 - (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
 - (4) 火気に近づけないでください。
 - (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- 〈貯法〉**
- 気密容器。火気を避けて室温保存。
- 【包装】** 50mL、100mL