

ビタミンC剤

第3類医薬品

ビタミンC
「ケンエー」

日本薬局方 アスコルビン酸 (原末)

VITAMIN C 「KENEI」

【使用上の注意】



注 意

相談すること

1. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
消 化 器	悪心・嘔吐

(2) 1ヶ月位服用しても症状がよくなる場合

2. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください

下痢

【効 能 効 果】

○ 次の諸症状の緩和：

しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着

○ 次の場合の出血予防：

歯ぐきからの出血、鼻出血

「ただし、これらの症状について、1ヶ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談してください。」

○ 次の場合のビタミンCの補給：

肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

【用 法 用 量】

15歳以上・・・・・・・・・・ 1回1包

11歳以上15歳未満・・・・・・・・ 1回2/3包

7歳以上11歳未満・・・・・・・・ 1回1/2包

3歳以上 7歳未満・・・・・・・・ 1回1/3包

1歳以上 3歳未満・・・・・・・・ 1回1/4包

いずれも1日2～3回食後に服用してください。

＜用法用量に関連する注意＞

(1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

(2) 定められた用法用量を厳守してください。

(3) 本剤は、1歳未満の乳児には服用させないでください。

【成 分 分 量】

本品 1包（0.6g）中 日局 アスコルビン酸 0.6g含有。

＜成分分量に関連する注意＞

本剤の服用により、尿及び大便の検査値に影響をおよぼすことがありますので、これらの検査を受ける場合は、本剤を服用していることを医師にお知らせください。

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

(2) 小児の手の届かない所に保管してください。

(3) 他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）

(4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

(5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

【包

装】

0.6g×60包