

日本薬局方

第3類医薬品

ヨクイニン末

(薏苡仁末)

Powdered Coix Seed

【使用上の注意】



注意

(使用前に必ずお読みください)



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
- (4) 胃腸の弱い人。
- (5) 発汗傾向の著しい人。
- (6) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師又は薬剤師に相談してください

1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

【効能・効果】

いぼ、皮膚のあれ

【用法・用量】

次の1回量を1日3回、食前又は食間に服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	2g（添付のサジ1杯分）	3回
15歳未満	服用しないでください	

添付のサジはすり切り1杯約2gです。

〈用法・用量に関連する注意〉

用法・用量を厳守してください。

【成分・分量】

1日量（6g）中 日本薬局方 ヨクイニン末 6g

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (5) 袋の中の脱酸素剤は品質を保持（カビ・害虫防止）するためのものです。（脱酸素剤は、のまないでください。）

本剤のような植物を調整、刻み、粉末にして使用する薬剤は、天然物を用いておりますので、産地・天候・収穫時期等を一定にするのは非常に困難であるため、ロットによりまして色・味・においに多少違いが生じることがあります。

【包装】 500g