

※※2012年3月改訂（第6版）
※ 2008年9月改訂

エタノール含浸綿

日本標準商品分類番号 872615

第3類医薬品

エタコット®

承認番号	(13AP)330
承認年月	2001年5月
販売開始	2001年11月

貯法：気密容器
火気を避けて
室温保存
使用期限：容器等に表示

ETHACOTTO

⚠ 使用上の注意

※※ 【してはいけないこと】 ❌

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください

※※ ● 損傷のある皮ふ。

※※ ● 目の周囲、粘膜等。

※※ 【相談すること】 🗣️

※※ 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

● 医師の治療を受けている人。

● 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

※※ 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 ぶ	発疹・発赤、かゆみ

【その他の注意】

本剤の使用により、アレルギーテストの検査に影響を及ぼすことがあります。

【効 能 効 果】 手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒。

※※【用 法 用 量】 そのまま塗擦、清浄用として用いてください。

〈用法用量に関連する注意〉

※※● 目に入らないように注意してください。

万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。

● 過度に使用すると、脱脂等による皮ふ荒れを起こすことがあります。

● 広範囲又は長時間使用する場合には、蒸気の吸入に注意してください。

● 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

● 外用にのみ使用してください。

● アルコール分がタンパク質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、医療機器等を清拭する際は血清、膿汁等を十分に洗い落してから使用してください。

● 薬液の蒸発を防ぐため、開封後は専用の容器に入れて、すみやかに使用してください。又、容器のフタはきちんと閉めてください。〔50枚、100枚、300枚のハード容器、ディスポ容器に記載〕

● 開封後はすみやかに使用してください。又、フタはきちんと閉めてください。〔100枚、300枚のフタ付ディスポに記載〕

● 薬液の蒸発を防ぐため、開封後は専用のフタをとりつけて、すみやかに使用してください。又、フタはきちんと閉めてください。〔30枚に記載〕

