

咽喉塗布剤

日本薬局方

第2類医薬品

複方ヨド・グリセリン

Compound Iodine Glycerin

【使用上の注意】



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 授乳中の人。
- (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (6) 口内又はのどのひどいただれのある人。
- (7) 甲状腺機能障害の診断を受けた人。
- (8) 患部が広範囲の人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消化器	悪心
その他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
アナフィラキシー様症状	胸苦しさ、むくみ、じんましん、発疹等があらわれる。

(2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

【効能効果】

のどの殺菌・消毒

【用法用量】

適宜、適量を患部に塗布してください。

＜用法用量に関連する注意＞

- (1) 用法用量を厳守してください。
- (2) のどに塗るとき、綿等に薬液をしみこませ過ぎないように注意してください。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (5) 塗布用のみ使用してください。
- (6) 薬液や薬液をしみこませた綿等を誤ってのみ込んだ時は、直ちに医師の診療を受けてください。

【成分分量】

100 mL中 ヨウ素1.2g、液状フェノール0.5 mL、グリセリン90 mL含有
添加物：ヨウ化カリウム、ハッカ水

- 【保管及び取扱い上の注意】**
- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
 - (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
 - (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
 - (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- 【包装】** 50 mL