

下 剤

日本薬局方

第2類医薬品

# 加香ヒマシ油

Aromatic Castor Oil

## 【使用上の注意】



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- 次の人は服用しないでください  
(1) はげしい腹痛又は吐き気・嘔吐のある人。  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3) 3歳未満の乳幼児。  
(4) 防虫剤(ナフタリン等)、殺そ剤(猫イラズ等)等の薬剤を誤って服用した人。(このような場合は、直ちに医師の治療を受けてください。)
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください  
駆虫薬、他の瀉下薬(下剤)
- 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
- 連用しないでください

### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
下痢

【効 能 効 果】 腸内容物の急速な排除(食あたり等)

【用 法 用 量】 本剤は、下記用量を1日1回を限度として、必要時、そのまま又は水、牛乳などに浮かべて服用してください。

大人(15歳以上) 20mL

11歳以上15歳未満 13mL

7歳以上11歳未満 10mL

3歳以上 7歳未満 6mL

### 〈用法用量に関連する注意〉

- 用法用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 就寝前の服用を避けてください。

【成 分 分 量】 1mL中 ヒマシ油0.99mL含有

添加物：オレンジ油、ハッカ油

- 【保管及び取扱い上の注意】**
- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
  - (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
  - (3) 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
  - (4) 火気に近づけないでください。
  - (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。  
(添付のコップは10mLです。)
- 【包装】** 20mL (10mL 計量コップ添付)