

無臭ニソニク成分(オキソアミチン末)入り

【使用上の注意】【相談すること】1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談すること。

【成分・分量】本品1日量<100mL(50mL×2)>中オキソアミチン末…200mg、ビタミンB₁硝酸塩…20mg、ビタミンB₂リン酸エステル…15mg、ビタミンB₆…50mg、ニコチン酸アミド…60mg、添加物:液糖(白糖・果糖・ブドウ糖)、クエン酸水和物、クエン酸ナトリウム水和物、DL-リンゴ酸、安息香酸ナトリウム、パラベン、エタノール、香料、エチルパラニン、グリセリン、パロリン、プロピレングリコールの本剤に配合されているビタミンB₁により、尿が黄色になることがあります。【効能・効果】●次の諸症状の緩和:神経痛、筋肉痛、関節痛(腰痛、肩こり、五十肩など)、手足のしびれ、便秘、眼精疲労●脚気「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」●次の場合のビタミンB₁の補給:肉体的疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時【用法・用量】大人(15才以上)1日2回、1回1本(50mL)を服用する。服用間隔は4時間以上おくこと。○定められた用法・用量を守ること。○小児には服用させないこと。【保管及び取扱い上の注意】(1)直射日光の当たらない、涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れかえないこと(誤用の原因になったり、品質が変わる)。(4)開封後はただちに服用すること。(5)使用期限をすぎた製品は服用しないこと。

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

発売元

第3類医薬品



ピップ株式会社

販売名:ピップ内服液50

大阪市中央区農人橋2-1-36 〒540-0011

G10FD

お客様相談室
土日・祝日を除く
10:00~17:00

東京 ☎ (03)3252-6546

大阪 ☎ (06)6945-4427

製造販売元

大同薬品工業株式会社

奈良県葛城市新村2-14-1 〒639-2121

製造番号

使用期限

P!

肩こり・眼精疲労

ピップ 内服液 50

50mL

腰痛・神経痛

第3類医薬品

