

2009年7月改訂

この添付文書は、本剤の服用前に必ずお読みください。なお、必要なときに読めるよう、大切に保管ください。

滋養強壮剤

第3類医薬品

ヘパティッサンC錠

(HEPA-TISSAN COMPOSITUM DRAGEES)

ヘパティッサンC錠は吸収しやすい形にまで酵素加水分解して得られた必須アミノ酸を含む牛乳蛋白分解物にクエン酸コリン、メチオニン、乾燥肝臓、乾燥酵母、それに数種のビタミンを加えて製造した蛋白補給の為の栄養剤で、小判形の黄色糖衣錠になっています。

疲れやすい方々の肉体疲労・食欲不振・発熱性消耗性疾患・栄養障害などの場合の栄養補給におすすめします。



⚠使用上の注意

相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - 薬によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 - 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- しばらく服用しても症状がよくなる場合

【成分・分量】1錠（0.8g）中

成分	分量	成分	分量
牛乳蛋白分解物	307.1930mg	ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB ₆ ）	0.8000mg
乾燥肝臓	7.2020mg	シアノコバラミン（ビタミンB ₁₂ ）	0.0004mg
DL-メチオニン	13.4000mg	アスコルビン酸（ビタミンC）	10.0000mg
クエン酸（二水素）コリン	75.0000mg	トコフェロール（ビタミンE）	2.0000mg
乾燥酵母	29.2046mg	ニコチン酸アミド	2.0000mg
チアミン硝酸塩（ビタミンB ₁ 硝酸塩）	0.4000mg	パントテン酸カルシウム	2.0000mg
リボフラビン（ビタミンB ₂ ）	0.4000mg		

添加物としてタルク、沈降炭酸カルシウム、アラビアゴム、セラック、酸化マグネシウム、ステアリン酸マグネシウム、珪藻土、白糖、黄色5号、パラベン、バニリンを含有。

〔効能・効果〕

- 滋養強壮
- 虚弱体質
- 肉体疲労・病後の体力低下・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

〔用法・用量〕

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	1錠	3回
15歳未満	服用しないこと	

(1) 定められた用法・用量を厳守してください。

(2) 錠剤の取り出し方

図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用して下さい。



(過ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)

保管及び取扱上の注意

- (1) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (2) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するために、他の容器に入れ替えないでください。
- (4) 使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

包装

50錠・100錠・200錠

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願いします。

アサヒフードアンドヘルスケア株式会社「お客様相談室」〒130-8602東京都墨田区吾妻橋1-23-1

☎ 0120-630755 受付時間 10:00~17:00（土、日、祝日を除きます）

発売元 **Asahi** アサヒフードアンドヘルスケア株式会社
東京都墨田区吾妻橋1丁目23番1号

製造販売元 **TC** 東洋カプセル株式会社
静岡県富士宮市中里東町560