

かゆみを伴うドライスキンに ケラチナミン^{ユウ}乳状液20


乾燥性皮膚用薬

<止まらないかゆみ、くり返すかゆみを伴うドライスキン>

乾燥によりバリア機能が低下したドライスキンでは、暖房や入浴などによる皮膚の温度変化や、衣類が触れただけのわずかな刺激でもかゆみが出やすくなっています。さらに、かくことで症状が悪化するため、一度かゆみが出ると止まらない、くり返すなどの悪循環に陥りやすくなります。

<かゆみをもとからすばやく抑制し、くり返さない肌に改善>

ケラチナミン^{ユウ}乳状液20は、かゆみ止め成分のジフェンヒドラミン塩酸塩がかゆみをすばやく抑え、抗炎症成分のグリチルレチン酸が炎症を鎮め、かゆみのもとの発生を抑えます。また、保湿成分の尿素が体内の水分を集めてうるおいを保ち、肌保護バール（基剤成分）が皮膚表面をしっとり包みます。かゆみを抑えながら保湿することでかゆみをくり返さない肌に改善していきます。



⚠使用上の注意

❌してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

次の部位には使用しないでください

- (1) 目のまわり、粘膜等。
- (2) 引っかき傷等のきずぐち、亀裂（ひび割れ）部位。
- (3) かさぶたの様に皮膚がはがれているところ。
- (4) 炎症部位（ただれ・赤くはれているところ）。

👤相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、刺激感（いたみ、熱感、ぴりぴり感）、はれ、かさぶたの様に皮膚がはがれる状態

3. 2週間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

かゆみを伴う乾燥性皮膚（成人・老人の乾皮症）

用法・用量

1日数回適量を患部に塗擦してください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を守ってください。
- (2)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3)小児(15歳未満)には使用させないでください。
- (4)外用にのみ使用してください。
- (5)化粧品ではありませんので、効能・効果で定められた患部のみに使用し、基礎化粧品等の目的で顔面には使用しないでください。


成分・分量(100g中)

成 分	分 量	働 き
尿 素	20.0g	体内の水分を皮膚に取りこんで、皮膚をしっとりなめらかにします。
ジフェニヒドラミン塩酸塩	1.0g	かゆみを鎮めます。
グリチルレチン酸	0.3g	皮膚の炎症を鎮めます。

〔添加物〕ワセリン、ステアリルアルコール、オリブ油、グリセリン、カルボキシビニルポリマー、キサンタンガム、スクワラン、ミリスチン酸オクチルドデシル、ポリソルベート60、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ステアリン酸ソルビタン、エデト酸Na、DL-アラニン、グリシン、クエン酸、水酸化Na

保管及び取扱い上の注意

- (1)本剤のついた手で、目など粘膜に触れないでください。
- (2)高温をさけ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (3)小児の手の届かない所に保管してください。
- (4)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (5)使用期限(外箱及び容器に記載)をすぎた製品は使用しないでください。
なお、使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早く使用してください。



●最初に使用する時は、キャップ①を手で固定し、ノズル②を矢印の方向に回すとポンプが上がります。中身が出るまで数回押してください。(ポンプが上がらない時はキャップをしめなおし、手で固定してから再度ノズルを矢印の方向に回してください。)また、ポンプ先端が汚れた場合、ティッシュ等でふき取ってください。

本製品に関するお問い合わせは、お買い求めのお店又は
興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センターへお願いします。
〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14
TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566
電話受付時間：月～金(祝日を除く)9:00～17:00

