

ビタミン含有保健薬

滋養強壮・
肉体疲労時の
栄養補給

キューピーコーワゴールドαプラス

生活環境がめまぐるしく変化する現代社会。仕事・家事・ストレス・睡眠不足などにより、「からだに疲れが残る」、「翌朝疲れがとれない」といった症状は日常的に起きています。疲れているのに休養がとれない状態が続くと、からだ全体に疲れが蓄積し、一晩休んだぐらいではなかなか疲れが抜けなくなってしまうかもしれません。こうしたからだの疲れには、キューピーコーワゴールドαプラスが効果的です。本剤には4種の滋養強壮生薬に加え、L-アルギニン塩酸塩と5種のビタミンが同時配合されており、すぐれた効果を発揮します。1回わずか1錠。しかも1日1回の服用でも、よく効くように出来ています。

からだ全体の疲れやだるさを感じた時、疲れがたまってしまった時には、早めにキューピーコーワゴールドαプラスを服用して対処してください。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐

- 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
下痢
- しばらく服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病後の体力低下・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

用法・用量

下記の量を水又は温湯で服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1錠	1～2回
15歳未満の小児	服用しないこと	

●朝・昼・晩、食前・食後にかかわらず、いつでも服用できます。

(1日2回服用する場合は、1回目の服用から6時間以上間隔をあげられることをおすすめします。)

<用法・用量に関連する注意>

用法・用量を厳守してください。

成分・分量 (2錠中)

成分・分量	働 き
トウキ乾燥エキス (トウキとして 25.0mg 100mg)	トウキの根から抽出された成分で、血流をよくすることでからだの疲れに効くと同時に、すぐれた滋養強壮効果をあらわします。
エゾウコギ乾燥エキス (エゾウコギとして 14.0mg 350mg)	エゾウコギの根から抽出された成分で、疲れに効くと同時に、すぐれた滋養強壮効果をあらわします。
オウギ乾燥エキス (オウギとして 30.0mg 240mg)	キバナオウギの根から抽出された成分で、生体内の新陳代謝を高め、すぐれた滋養強壮効果をあらわします。
オキシアミヂン末 50.0mg	ニンニクから抽出された成分で、ニンニク特有のニオイがおさえてあり、からだの調子が悪い時、すぐれた滋養強壮効果をあらわします。
L-アルギニン塩酸塩 50.0mg	アミノ酸の一種で、からだに元気がない時、エネルギー源の合成・貯蔵を促進します。
チアミン硝化物 (V.B ₁) 10.0mg	疲れたからだに必要な5種のビタミンが補給され、栄養物のエネルギー化を促します。
リボフラビン (V.B ₂) 4.0mg	
ピリドキシン塩酸塩 (V.B ₆) 10.0mg	
トコフェロールコハク酸エステルカルシウム [dl- α -トコフェロールコハク酸エステル(V.E)として 20.7mg 20mg]	
L-アスコルビン酸ナトリウム [L-アスコルビン酸 (V.C) として 112.6mg 100mg]	
無水カフェイン 50.0mg	中枢神経に働いて、疲れに効きます。

〔添加物〕ヒドロキシプロピルセルロース、セルロース、クロスボビドン、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、白糖、アクリル酸エチル・メタクリル酸メチル共重合体、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、タルク、アラビアゴム、炭酸Ca、ゼラチン、リン酸水素Na、酸化チタン、黄色五号、カルナウバロウ

<成分・分量に関連する注意>

本剤の服用により尿が黄色くなることがありますが、ビタミンB₂ (リボフラビン) によるものですから心配ありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 高温をさけ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 水分が錠剤につくと、錠剤表面が変色したり、亀裂を生じたりすることがありますので、水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。誤って錠剤をぬらした場合は、ぬれた錠剤を廃棄してください。
- (5) 容器の中の詰め物は、輸送中に錠剤が破損するのを防止するのために入れてあるので、キャップをあけた後は、必ず捨ててください。
- (6) 容器の落下等の衝撃により錠剤に亀裂が入り、品質に影響を与えることがありますので、外箱に入れて保管するなど、取扱いに注意してください。
- (7) 外箱及びラベルの「開封年月日」記入欄に、キャップをあけた日付を記入してください。
- (8) 使用期限(外箱及びラベルに記載)をすぎた製品は服用しないでください。また、一度キャップをあけた後は、品質保持の点から開封日より6ヵ月以内を目安に服用してください。



本製品に関するお問い合わせは、お買い求めのお店又は
興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センターへお願いします。
〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14
TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566
電話受付時間：月～金 (祝日を除く) 9:00～17:00



製造販売元 興 和 株 式 会 社 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

