



■成分・分量(50mL中)/合成ヒドロタルサイト400mg オキシアミジン末30mg 人參乾燥エキス90mg (ニンジン603mg) オウレン流エキス-B 0.3mL(オウレン300mg) 生姜流エキス0.3mL(ショウキョウ300mg) ゴシユ流エキス0.3mL(ゴシユ300mg) 蒼朮流エキス0.4mL(ソウジュツ400mg) ウルンデオキシコール酸15mg カンゾウエキス末86mg (カンゾウ602mg)[添加物]白糖、安息香酸Na、パラベン、セルロース、カルメロースNa、ポビドン、メントール、香料、エタノール■使用上の注意/してはいけないこと(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起これやすくなる)1.次の人は服用しないこと 透析療法を受けている人。2.長期連用しないこと 相談すること1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(3)次の診断を受けた人。腎臓病 2.2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること



胃腸薬

液キャベコーフ

もたれ・ムカムカ・はきけ
「スッキリしたい」時

50mL

■効能・効果/もたれ、はきけ(二日酔・悪酔のむかつき、むかつき、胃のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、飲み過ぎ、食べ過ぎ、胃部・腹部膨満感、消化不良、胸やけ、胸つかえ、食欲不振、胃弱

■用法・用量/成人(15歳以上)1日1回、1本を服用すること。●用法・用量を厳守すること。■保管及び取扱い上の注意/(1)高温をさけ、直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4)使用期限をすぎた製品は服用しないこと。●懸濁内服液なので服用の際、瓶をよく振ること。

第2類医薬品 販売名 液キャベコーフ

金属:キャップ
ガラス:瓶



ラベル:PET



製造 興和株式会社
販売元 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14
製造 中外医薬生産株式会社
三重県伊賀市ゆめが丘七丁目5-5

製品の間合せ先 興和(株) 03-3279-7755

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931