

狙ったところに  
イチッと塗れる!

ハラコ  
コロ  
チボル採用

Kowa

# プチウナ<sup>コワ</sup>

プチブルー

つめた～いかゆみ止め

かゆみ・虫さされに

12mL

開け口

第2類医薬品

## かゆみ・虫さされ用薬 プチウナ

第2類医薬品

この台紙は本剤とともに保管し、使用の際には、よくお読みください。

## ⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)  
次の部位には使用しないこと (1)創傷面。(2)目や目の周囲、粘膜等。

## 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(3) 温潤やただれのひどい人。
  2. 使用後、次の症状があわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この台紙を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- | 関係部位 | 症状           |
|------|--------------|
| 皮膚   | 発疹・発赤、かゆみ、はれ |
3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この台紙を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること



成形シート: PET  
キャップ: PP  
中栓: PE, PP  
ボトル: PP  
ラベル: PET

**[効能・効果]**かゆみ・虫さされ 【用法・用量】1日数回適量を患部に塗布する。<用法・用量に関連する注意>(1)用法・用量を守ること。(2)小児に使用される場合には、保護者の指導監督のもとに使用されること。(3)目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。(4)外用のみ使用すること。(5)薬剤塗布後の患部をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないこと。また、ひざの裏やひじの内側等に使用する場合は、皮膚を密着(正座等)させないこと。 【成分・分量】(1mL中)ジフェニヒドラミン塩酸塩20.0mg リドカイン5.0mg d-メントール30.0mg dl-カンフル20.0mg [添加物]エト酸Na、クエン酸、ゲラニオール、エタノール 【保管及び取扱い】

**上の注意**(1)高温を避け、直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わること)。(4)本剤のついた手で、目や粘膜に触れないこと。(5)容器が変形するおそれがあるので、車の中など、高温になる場所に放置しないこと。容器の変形により、塗布部の脱落や、液もれがおこるおそれがあるので注意すること。

(6)本剤が衣類や寝具などに付着し汚れた場合にはなるべく早く水か洗剤で洗い落すこと。(7)メガネ、時計、アクセサリーなどの金属類、衣類、プラスチック類、床や家具などの塗装面等に付着すると変質があるので、付着しないように注意すること。(8)火気には近づけないこと。(9)使用期限(台紙及び容器に記載)をすぎた製品は使用しないこと。

製造  
番号使用  
期限

## &lt;容器の使い方&gt;

キャップをとり、図のように容器を下に向け、先端のボールを転がすようにして患部に塗布してください。  
使用後は必ずキャップをしっかりと閉めてください。

※患部を清潔にしてから使用し、使用後も清潔に保ってください。

T1600 E3K  
0000

お問い合わせ先  
興和(株)お客様相談センター  
TEL 03-3279-7755  
月~金(祝日を除く)9:00~17:00

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931



4 987067 224401

製造販売元 興和株式会社  
東京都中央区日本橋本町三丁目4-14