



ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要なときに読めるように大切に保管して下さい。

ねむくならない／頭痛薬

ノーイチS[®]

第②類医薬品

ねむくならない・・・ノーイチSには、ねむくなる成分が入っておりませんので車の運転中にも、ビジネス中にも服用できます。
早く効きます・・・ノーイチSは微粉末の製剤になっていますので、胃の中で早く溶け、早く効きます。
胃にソフト・・・ノーイチSには、胃障害の少ない成分が配合されています。

〔⚠ 使用上のご注意〕

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないで下さい。

- (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい。

他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬

3. 服用時は、飲酒をしないで下さい。

4. 長期連用しないで下さい。



相談すること

1. 次の人は、服用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談して下さい。

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる婦人。
- (3) 水痘（水ぼうそう）もしくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児（15才未満）
- (4) 高齢者。
- (5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (7) 次の診断を受けた人。

心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書をもって医師、歯科医師又は薬剤師に相談して下さい。

(1) 服用後、次の症状が現れた場合。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

(➡裏面に続きます)

まれに、下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる
ぜんそく	

(2)5～6回服用しても症状がよくなる場合。

効能・効果

- 1) 頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛（生理痛）・外傷痛の鎮痛
- 2) 悪寒・発熱時の解熱

用法・用量

年令区分	1 回量	左記 1 回量を 1 日 3 回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用して下さい。 服用間隔は 4 時間以上おいて下さい。
15 才以上	1 包	
7 ～ 14 才	1/2 包	
3 ～ 6 才	1/3 包	

- お子さまに服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
- 用法及び用量をお守り下さい。
- 3才未満のお子さまには服用させないで下さい。

成分・分量

本品 1 日量（3 包）中		1 包量 0.6 g
成 分	分 量	作 用
アセトアミノフェン	450mg	頭痛・歯痛・関節の痛み・発熱等にすばやい効果があります。
エテンザミド	750mg	
無水カフェイン	240mg	他の成分の働きを助けます。

添加物として、合成ケイ酸Al、リン酸水素Ca水和物、バレイシヨデンブ、メタケイ酸アルミン酸Mg、無水ケイ酸を含有します。

保管・取扱上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2)お子さまの手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり、品質が変わることがあります）
- (4)使用期限の過ぎた製品は服用しないで下さい。
- (5)1 包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2 日以内に使用して下さい。

消費者ご相談窓口

本剤をご使用になり、何かお気づきの点がございましたら下記発売元までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

発売元 **ノーイチ薬品株式会社** 大阪府松原市高見の里4丁目8番16号
フリーダイヤル 0120-31-0499
受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）

製造販売元 **株式会社 廣 昌 堂** 富山県射水市水戸田2841