

この説明書は、使用前によくお読みください。
 なお、使用が終わるまで大切に保管してください。

第②類医薬品

リゾチーム塩酸塩配合 鎮咳去痰薬 カネドリンW液A

本品はノンシュガー製品です。

「せき」はのどや気管支の炎症などによって起こります。「せき」が頻発したり、長く続くと、のどを痛めたり声がかれたりするだけでなく、睡眠をさまたげ、体力を消耗させ、ひいては病気に対する抵抗力を低下させ、好ましくない症状を引き起こす原因になります。

カネドリンW液Aは「せき」の中枢に作用する成分、気管支を拡張させて「せき」をしずめる成分、「たん」をうすめてはき出しやすくする成分などを配合していますので「せき」や「たん」にすぐれた効果を期待できます。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください
 本剤又は鶏卵によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
 他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)、鎮静薬
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
 (眠気があらわれることがあります。)
4. 過量服用・長期連用しないでください
 (倦怠感や虚脱感等があらわれることがあります)



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

(1) 医師の治療を受けている人。	(8) 次の診断を受けた人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。	心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害
(3) 授乳中の人。	(9) 乳児
(4) 高齢者。	(乳児において、本剤に含まれるリゾチーム塩酸塩
(5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。	を初めて服用した時に、ショック(アナフィラキシー)
(6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。	があらわれたとの報告があります。)
(7) 次の症状のある人。	

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しき等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。

- (2) 5～6回服用しても症状がよくならない場合
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください
 便秘、口のかわき

【効能・効果】

せき、たん

【用法・用量】

次の1回量を添付の目盛り付きコップで量り、1日3回毎食後及び必要に応じて、就寝前に服用してください。
また、1日5～6回まで服用しても支障ありませんが、その場合には約4時間の間隔をおいて服用してください。

年 齢	1回量
15歳以上	10 mL
11歳以上 15歳未満	6.5 mL
8歳以上 11歳未満	5 mL
5歳以上 8歳未満	3 mL
3歳以上 5歳未満	2.5 mL
1歳以上 3歳未満	2 mL
3ヵ月以上 1歳未満	1 mL
3ヵ月未満	服用しないでください

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1)用法及び用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)2歳未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

【成分・分量と作用】

1日量(60mL)中

成 分	分量	作 用
ジヒドロコデインリン酸塩	30 mg	せき中枢に作用してせきをしずめ、呼吸を楽にします。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	75 mg	気管支をひろげて緊張をやわらげ、せきをしずめます。
グアイフェネシン	300 mg	気道粘液の分泌をたかめ、たんをうすめてはき出しやすくします。
リゾチーム塩酸塩	60 mg (力価)	粘稠なたんを分解し、はき出しやすくします。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	12 mg	抗ヒスタミン剤で、アレルギーが原因となって起こるせきをしずめます。
カフェイン水和物	72 mg	抗ヒスタミン剤による眠気を防止します。
キキョウ流エキス (原生薬換算量：1 g)	1 mL	粘りついているたんをうすめてはき出しやすくします。

添加物として、D-ソルビトール液、クエン酸水和物、サッカリンナトリウム水和物、安息香酸Na、パラベン、プロピレングリコール、エタノール、赤色2号、香料、バニリン、その他1成分を含有します。

＜成分・分量に関連する注意＞

本剤は生薬成分を配合していますので、沈殿を生じることがありますが、効果に変わりありません。
よく振って服用してください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)誤用をさげ品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
- (4)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。
- (5)服用のつど、ピンの口をよく拭き、フタをしっかりとめておいてください。
- (6)いったん開栓した後は、品質保持の点からなるべく早く服用してください。
- (7)添付の目盛り付きコップはご使用のつど、水洗いなどして常に清潔に保管してください。

発 売 元 **ノイジ** 薬品株式会社

大阪府松原市高見の里4丁目8番16号
お客様相談室 072-331-0417
受付時間 9時～17時(土日祭を除く)

製造販売元 **福地製薬株式会社**

滋賀県蒲生郡日野町寺尻824