

スッとするクール感で痛みを鎮める

ヂナンコーハイAX

注入軟膏

第②類医薬品

痔疾用薬

抗炎症作用のヒドロコルチゾン酢酸エステルを始め、有効成分を軟膏状にして、使いやすい注入式容器に入れた痔疾用剤です。

痛み・かゆみ

局所麻酔作用のあるリドカインで
痛み・かゆみを鎮めます。

はれ・出血

ヒドロコルチゾン酢酸エステル
と酸化亜鉛で、出血を止め、はれ
を抑え、患部を保護します。

- ご使用の前に入浴又はぬるま湯を用い、ガーゼなどで患部をきれいにしますと、一層効果的です。
- 排便時の痛みが激しい時は、1時間ほど前に注入しておきますと、排便時の痛みをやわらげ、便の通りをよくします。

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2) 患部が化膿している人。

2. 長期連用しないこと



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
そ の 他	刺激感、化膿

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 10日間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和

用法・用量

[注入する場合] 容器先端部を肛門部に挿入し、全量をゆっくり注入してください。

年齢	1回量	使用回数
成人(15歳以上)	1個	1日1~2回
15歳未満	使用しないこと	

または

[塗布する場合] 次の量を肛門部に塗布してください。なお、一度塗布に使用したものは、注入には使用しないでください。

年齢	1回量	使用回数
成人(15歳以上)	適量	1日1~2回
15歳未満	使用しないこと	

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 肛門部にのみ使用してください。
- (3) 肛門内に注入する場合、容器先端部分のみを挿入してください。

成分と働き

成 分 1個(2.0g)中	作用
ヒドロコルチゾン酢酸エステル… 5.0mg	抗炎症作用
リドカイン…………… 60.0mg	鎮痛・鎮痒作用
トコフェロール酢酸エステル… 50.0mg	血流改善作用
酸化亜鉛…………… 100.0mg	收れん・保護作用
アラントイン…………… 20.0mg	組織修復作用
Q-メントール…………… 10.0mg	清涼感
添加物として、サラシミツロウ、流動パラフィン、スクワラン、オリブ油、ワセリンを含有します。	

使用方法及び治療のポイント

①キャップを静かにはずしてください。



②すべりをよくするため薬剤を少量出して先端部に塗ってください。




③肛門に深く挿入し、容器内の薬剤が十分に注入されるよう強く押し出してください。



内部に注入する場合

④適量を直接患部に塗るか、ガーゼなどにのばして患部にあててください。



外部に塗布して使用する場合

●注入式のため、容器の中に少量残りますが、残量を見込んで薬剤は十分充填してあり、必要量は、肛門内に注入されます。又、寒い時期、容器が多少硬くなりますが、手の中で温めると出やすくなります。

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記までご連絡ください。

〒 656-1501 兵庫県淡路市尾崎 859 ムネ製薬株式会社

消費者相談窓口 電話 0120-85-0107

製造販売元 株式会社 雪の元 本店
奈良県橿原市大谷町182番地

1804-TYP

包装

10個入、20個入、30個入
(1個ずつシール包装)

特長

6つの有効成分 軟膏状の薬剤が直接患部にとどき、効果を発揮します。

2通りの使い方 患部が肛門内部(内痔)の場合には注入、

患部が肛門外部(外痔)の場合には塗布してください。

衛生的 注入部が細く、スムーズに手を汚さずに自分で注入できます。

養生訓

1. 毎日入浴する。(患部の清潔と血行の改善)

2. 野菜、海草等繊維の多い食事にする。
(便の量を増やし便をやわらかくし、便通を改善)

3. 香辛料は控えめにする。
(排便時に患部を刺激する)
4. 深酒をつづむ。
(肛門に負担をかけ、患部のうっ血をまねく)
5. トイレは3分以内にすませ、あと必ず清拭する。

〈保管及び取り扱い上の注意〉

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり、品質が変ります。)
- (4) 期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早くご使用ください。

発売元 ムネ製薬株式会社
兵庫県淡路市尾崎859