

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

1日1回型 水虫治療薬

新ビホナ エース

第2類医薬品

製品の特徴

みずむしやたむしは白癬菌というカビの1種が原因となる皮膚病で、一般にたまらないかゆみを伴います。白癬菌は高温多湿を好み、薬剤の浸透しにくい皮膚表面の角質層を棲家とするため根治し難く、再発し易い疾患です。

本剤は、白癬菌などに対して長い時間にわたって殺菌効果を示すビホナゾールを配合しているため、通常1日1回の塗布により効果をあらわし、さらに、たまらないかゆみを抑える4つの成分をプラスした、多忙な現代人の生活にピッタリの、みずむし・たむし治療剤です。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと ☒

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。）
次の部位には使用しないでください。

- (1)目や目の周囲、顔面、粘膜（例えば、口腔、鼻腔、膣等）、陰のう、外陰部等
- (2)湿疹
- (3)湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - (1)医師の治療を受けている人
 - (2)乳幼児
 - (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (4)患部が広範囲の人
 - (5)患部が化膿している人
 - (6)「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人
（陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い）
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。



関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感、熱感、ただれ、乾燥感、ヒリヒリ感

3. 2週間位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

[効能・効果]

みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

[用法・用量]

患部を清潔にして、1日1回、適量を患部に塗布してください。

[用法・用量に関連する注意]

- (1)患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (2)目に入らないようご注意ください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させていただきます。
- (4)外用にのみ使用してください。
- (5)定められた用法、用量を厳守してください。

[成分・分量] 1 mL中

成分名	分量	作用等
ビホナゾール	10mg	1日1回で、みずむし菌を殺します。
リドカイン	20mg	かゆみ、痛みを即座に抑えます。
クロタミトン	50mg	かゆみを持続的に抑えます。
グリチルレチン酸	5mg	炎症を抑えます。
l-メントール	20mg	スツとする使用感で、かゆみを軽減します。

添加物：ミリスチン酸イソプロピル、マクロゴール、水酸化Na、塩酸、八アセチルしょ糖、エタノール

[保管及び取扱い上の注意]

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に、密栓して、立てて保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4)火気に近づけないでください。
- (5)使用期限(外箱記載)を過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であってもなるべく速やかに使用してください。
- (6)メガネ、時計、アクセサリーなどの金属類、アルコール類や油脂類などで変質・変色のおそれのあるもの(プラスチック製品、化学繊維、皮革、家具、床など)への本剤の付着は避けてください。



みずむし治療のポイント

1. 清潔 患部も衣類(靴下)もこまめに洗い清潔に。
2. 乾燥 靴を脱ぐ、靴下も脱ぐ、風通し良く、よく乾燥。
3. 根気 風呂あがりの薬剤治療、痒くなくても1シーズン。

本品についてお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡ください。[受付時間 9:00~17:00(土、日及び祝日を除く)]

新生薬品株式会社 消費相相談窓口 電話番号(076)472-0361
〒930-0364 富山県中新川郡上市町横越16番1