

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また必要な時に読めるよう大切に保存してください。

殺菌消毒薬

第3類医薬品

マルコフラノンP軟膏

マルコフラノンP軟膏には、殺菌成分のアクリノール水和物（アクリジン系殺菌薬）、消炎成分のグリチルレチン酸と収れん、保護成分の酸化亜鉛を配合し、切傷、すり傷、創傷面の殺菌・消毒などに効果を表します。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 患部が広範囲の人。
- (5) 深い傷やひどいやけどの人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

【効能・効果】

切傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒

【用法・用量】

1 日数回、適量を患部に塗布又はすり込むか、ガーゼなどに延ばして貼付してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 外用にのみ使用してください。

【成分・分量】

100 g 中

成 分	分 量
アクリノール水和物	0.5 g
グリチルレチン酸	0.5 g
酸化亜鉛	25.0 g

添加物として、タルク、マクロゴール、ゲル化炭化水素、自己乳化型ステアリン酸グリセリン、BHA、没食子酸プロピルを含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- (4)配置期限の過ぎた製品は使用しないでください。

**■お問い合わせ先**

本品に関するお問い合わせは、お買い求め先、または下記にお願い申し上げます。

株式会社 廣貫堂 「お客様相談窓口」

電話番号：076-424-2259

受付時間：9時から17時まで（土・日・祝祭日を除く）

製造販売元



株式会社 廣 貫 堂

〒930-0055 富山市梅沢町2丁目9-1

副作用被害救済制度の問い合わせ先

（独）医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931（フリーダイヤル）