


ご使用前にこの添付文書を必ずお読みください。
また、必要時にそなえて大切に保管してください。



第2類医薬品

じんましん、皮膚のかゆみ、鼻炎に
抗アレルギー錠「クニヒロ」

じんましんや皮膚のかゆみがあると、何事にも熱中できずがまんのできないものです。

また、鼻炎に伴う鼻みず、鼻づまりなどの症状も大変つらいものです。

抗アレルギー錠「クニヒロ」は、これらの症状を緩和する抗ヒスタミン剤を配合し、また皮膚や粘膜を正常に保つビタミンB₆を配合した製品です。



△[使用上の注意]

してはいけないこと ❌

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。
他のアレルギー用薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬、乗物酔い薬等）
2. 服用後、乗物または機械類の運転操作をしないでください。
(眠気等があらわれることがあります。)
3. 長期連用しないでください。

相談すること 🗣️

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
 - (3) 高齢者。
 - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (5) 次の症状のある人。
むくみ、排尿困難
 - (6) 次の診断を受けた人。
心臓病、高血圧、腎臓病、緑内障

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
泌 尿 器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらくらとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。
□のかわき、眠気
4. 5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この添付文書を持って、医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

[成分と作用] 1日量（9錠）中

成 分	含量	作 用
クロルフェニラミンマレイン酸塩	13.5mg	抗ヒスタミン作用によりかゆみや炎症を抑えます。
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆)	22.5mg	皮膚や粘膜を正常に保つビタミンです。
グリチルリチン酸カリウム	180mg	炎症を抑えます。
グルコン酸カルシウム水和物	1350mg	じんましん等の症状を緩和します。

添加物として、セルロース、カルメロースカルシウム、ステアリン酸マグネシウムを含有します。

[効能・効果]

皮膚のかゆみ、湿疹、じんましん、皮膚炎、かぶれ
鼻炎

[用法・用量]

次の1回量を水またはお湯でかまずに服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人(15歳以上)	3 錠	2 ～ 3 回
7歳以上15歳未満	2 錠	2 回
4歳以上7歳未満	1 錠	2 回
4歳未満の幼児	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 4歳以上の幼児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないよう、よく注意してください。

[保管および取扱い上の注意]

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するために他の容器に入れかえないでください。
- (4) ピンの中の詰め物は、輸送中の錠剤の破損を防止するために入れてありますので、フタをあけた後はすててください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本製品についてのご相談は、お客様相談窓口までお願い致します。

お客様相談窓口 フリーダイヤル 0120-023520

受付時間 平日9：00～17：00（土、日、祝日を除く）

兵庫県尼崎市長洲本通2丁目8番27号

皇漢堂製薬株式会社

(13.9.改訂)