



ご使用前にこの添付文書を必ずお読みください。
また、必要時にそなえて大切に保管してください。

第②類医薬品



生薬製剤 センナ錠

「センナ」は古くからアラビアの医師によって使
用されていた植物で、欧米諸国では繁用されている
緩下薬です。日本でもセンナといえば、便秘および
便秘に伴う諸症状の緩和に広く用いられています。

原産地はアフリカ、アラビア半島南部、インドなど
で、日本は主にインド南部から輸入しています。

有効成分として、アントラキノン誘導体の
Sennoside A・B、rhein、aloeemodin,
chrysophanolなどが知られています。



⚠[使用上の注意]

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
他の瀉下薬（下剤）
2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避け
てください。
3. 大量に服用しないでください。

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 次の症状のある人。

はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直
ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師または登録販
売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持
続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師または
登録販売者に相談してください。

下痢

4. 1週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この添
付文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

[成分] 1日量（10錠）中

白芍 センナ末 1,500mg

添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースカルシウム、セルロース、タルク、ステアリン酸マグネシウムを含有します。

[効能・効果]

便秘

便秘に伴う次の症状の緩和：

頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振（食欲減退）、腹部膨満、腸内異常酵素、痔

[用法・用量]

次の1回量を1日2回を限度とし、なるべく空腹時に水またはお湯でかまことに服用してください。

服用間隔は4時間以上おいてください。ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しづつ增量または減量してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	3～5錠	2回
11歳以上15歳未満	2～3錠	
11歳未満の小児	服用しないこと	

<用法・用量に関する注意>

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。



[保管および取扱い上の注意]

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するために他の容器に入れかえないでください。
- (4) ビンの中の詰め物は、輸送中の錠剤の破損を防止するために入れてありますので、フタを開けた後はすぐてください。
- (5) 箱およびビンの「開封年月日」記入欄に、開封した日付を記入し、ビンをこの文書とともに箱に入れたまま保管してください。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

* 本製品は天然物（生薬）を用いており、また滅菌した原料を用いておりますので、若干色調が異なることがあります。効果は変わりありません。

本製品についてのご相談は、お客様相談窓口までお願い致します。

お客様相談窓口 フリーダイヤル 0120-023520

受付時間 平日9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

兵庫県尼崎市長洲本通2丁目8番27号

皇漢堂製薬株式会社