

使用前にこの添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

皮膚疾患・外傷治療薬（軟膏）

第2類医薬品

阪本赤まむし膏[®]

特 徴

阪本赤まむし膏は、微生物に対する抗菌作用及び鎮痒作用のあるサリチル酸と、患部・創面の収れん・乾燥・防腐作用のある次硝酸ビスマス主剤とし、これらの成分が皮膚に浸透するのを助ける蛇油（マムシ脂）を配合し、使用感を爽やかにするd-ボルネオールを添加した外用軟膏です。



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

次の部位には使用しないこと

- (1) 目や目の周囲、粘膜（例えば、口腔、鼻腔、膣等）、陰のう、外陰部等。
- (2) 湿疹。
- (3) 湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 乳幼児。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 患部が広範囲の人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 2週間位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

■効能・効果

きりきず、にきび、手足顔のあれ、かゆみ、ひび、あかぎれ、しもやけ、いんきん、たむし、水虫、疥癬、くさ

■用法・用量

患部の大小により脱脂綿又は紙にのばし一日二回重症なれば三四回貼用す

用法・用量に関連する注意

- (1) 患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。

■成分・分量：本品1g中

成 分	分 量	成 分	分 量
日局 次硝酸ビスマス	40mg	日局 サリチル酸	19mg

添加物：蛇油（ママシ脂）、精製ラノリン、白色ワセリン、サラシミツロウ、d-ボルネオール

成分・分量に関連する注意

特有のにおいは、d-ボルネオールによるもので、変質ではありません。

■保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わります。）。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

お客様相談室

電話 06-6131-1300（祝祭日を除く月～金曜日 10:00～17:00）

製造販売元

株式会社 阪本漢法製薬
大阪市北区曽根崎2丁目7番4号
<http://www.sakampow.com>