

ラクール 経皮吸収型消炎鎮痛冷感パップ剤

新インペタンm ミニ

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
- 次の人は使用しないでください
 - 本剤又は本剤の成分により過敏症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
 - ぜんそくを起こしたことがある人。
 - 15歳未満の小児。
 - 次の部位には使用しないでください
 - 目の周囲、粘膜等。
 - 湿疹、かぶれ、傷口。
 - みずむし・たむし等または化膿している患部。
 - 連続して2週間以上使用しないでください



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦または妊娠していると思われる人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

- 5～6日間使用しても症状がよくなりえない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

※帯状疱疹

本剤の使用中に痛みをとまなう赤味を帯びた米粒大の水疱があらわれた場合には、ウイルスによる帯状疱疹であることが多く、副作用と間違えられることがあります。このような場合には使用を中止して、皮膚科専門医の診療を受けてください。

製造番号

使用期限

特 徴

- インドメタシン配合で、痛みのもとに優れた効果を発揮します。
- 便利な小判サイズなので切らずにラクに貼れます。
- 全方向伸縮タイプで関節部位にもピタッとフィットします。

販売名 新インペタンm

●成分・分量

膏体100g中

インドメタシン.....0.5g
 添加物として、カオリン、酸化チタン、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、ポリアクリル酸部分中和物、カルボキシビニルポリマー、CMC-Na、D-ソルビトール、グリセリン、エデト酸Na、N-メチル-2-ピロリドン、ケイ酸アルミン酸Mg、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、 β -メントールを含有します。

●効能・効果

腰痛、関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘等)、筋肉痛、打撲、ねんざ、肩こりに伴う肩の痛み

●用法・用量

- プラスチックフィルムをはがし、1日2回を限度として患部に貼付してください。
- 15歳未満の小児は使用しないでください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1)本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。
- (2)定められた用法・用量をお守りください。
- (3)汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。
- (4)皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

●保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)品質保持のため、未使用分は袋に入れ、開口部のファスナーを閉めて保管してください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
 <電話> 0120-149-931 (フリーダイヤル)

〈お問い合わせ先〉

ラクール薬品販売株式会社
 フリーダイヤル 0120-86-8998



発売元
 ラクール薬品販売株式会社
 東京都足立区鹿浜1丁目9番14号



製造販売元
 東光薬品工業株式会社
 東京都足立区新田2丁目16番23号



ここを押して
 開けてください。