

切り口

切り口にそって手でゆっくり開封してください

切り口

開封後は開口部をおりまげて保存してください。

ご使用に際し、この説明文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

## ⚠ 使用上の注意

## ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください

(1) 本剤によるアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。(2) ぜんそくを起こしたことがある人。(3) 妊婦または妊娠していると思われる人。(4) 15歳未満の小児。

2. 次の部位には使用しないでください

(1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。(3) みずむしたむしり等または化膿している患部。

3. 連続して2週間以上使用しないでください

## 🗨 相談すること

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談してください

(1) 医師の治療を受けている人。(2) 本人または家族がアレルギー体質の人。(3) 薬や化粧品等によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師または薬剤師に相談してください

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ、水疱

(2) 5～6日経使用しても症状がよくなる場合。

## その他の注意

(1) 入浴する場合は、貼った場所がヒリヒリする場合がありますので、必ず30分以上前にはがしてください。また、入浴後は30分以上経過してからご使用ください。

(2) 発熱するもの(コタツ、ホットカーペット、カカロ、電気毛布等)と併用しますと、刺激が強くなる場合がありますので、ご注意ください。

## ● 効能・効果

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みとそれ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

## ● 用法・用量

表面のフィルムをはがし、1日2回を限度として患部に貼付してください。

&lt;用法・用量に関連する注意&gt;

(1) 定められた用法・用量をお守りください。(2) 本剤は痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用してください。(3) 汗をかいたり、患部がぬ

れている時は、よくふきとってから使用してください。(4) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い場所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。(5) 皮膚の弱い人は、同じところに続けて貼らないでください。

● 成分・分量(膏体100g中) 1枚10cm×14cm、膏体量2g  
フェルピナク……………3.5g イ-メントール……………3.0g

添加物: BHT、タルク、ステレン・インブレン・ステレンプロックコポリマー、テルペン樹脂、N-メチル-2-ピロリドン、ノニルグリニルアミド、流動パラフィン

## ● 保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)(4) 品質保持のため、未使用分は袋に入れ、開口部をおりまげて保管してください。(5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。

製造番号

副作用救済制度 電話0120-149-931

使用期限



〈お問い合わせ先〉

本製品に関するお問い合わせは、下記までご連絡  
頂きますようお願い申し上げます。

ラクール薬品販売株式会社 フリーダイヤル 0120-86-8998

