

ご使用に際し、この説明文書(台紙)を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

RAKUL

ラクール
0-300
ピロ

虫さされ
かゆみ

20mL

※製造番号・使用期限は
容器底面に記載

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。(2) 本人または家族がアレルギー体質の人。
(3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(4) 湿潤やただれの
ひどい人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書をもって医師または薬剤師に
相談してください

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合。

★ 効能・効果 ★ かゆみ、虫さされ

★ 用法・用量 ★ 1日数回、適量を患部に塗布してください

〈用法・用量に関連する注意〉(1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監
督のもとに使用させてください(2) 目に入らないよう注意してください。万
一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症
状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください(3) 本剤は外用にのみ使
用し、内服しないでください(4) 定められた用法・用量を守ってください

★ 成分・分量 ★ 100mL中

ジフェンヒドラミン塩酸塩……………2.0g リドカイン……………0.5g
l-メントール……………3.0g dl-カンフル……………2.0g
添加物：クエン酸水和物、ヒドロキシプロピルセルロース、エタノール、
アジピン酸ジイソプロピル、ハアセチルしょ糖、アンモニア

★ 保管及び取扱い上の注意 ★

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください
(2) 小児の手の届かない所に保管してください(3) 他の容器に入れかえないでく
ださい(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)(4) 火気に近づけな
いでください(5) メガネ、時計、アクセサリーなどの金属類、化繊の衣類、プラスチ
ック類、床や家具などの塗装面に付着すると変質することがありますので、付着
しないよう注意してください(6) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください

※液が出にくい場合は、ボールをよく回転させながら塗布してください

発売元

ラクール薬品販売株式会社
東京都足立区鹿浜1丁目9番14号

製造販売元

東光薬品工業株式会社
東京都足立区新田2丁目16番23号

お問い合わせ先 0120-86-8998

副作用被害救済制度
電話：0120-149-931



台紙



透明ケース

A

4



ひんがし

ミシン目をつけて開けられます