

⚠️【使用上の注意】

ご使用に際し、外箱に記載の説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の部位には使用しないでください
(1)水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等または化膿している患部。
(2)創傷面。(3)目や目の周囲、粘膜(例えば、口唇等)。
2. 顔面には広範囲に使用しないでください 3. 長期連用しないでください

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。(2)本人または家族がアレルギー体質の人。(3)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(4)患部が広範囲の人。(5)潤滑やただれのひどい人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。
(1)使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
皮ふ(患部)	みずむし・たむし等の白癬症、にきび、 化膿症状、持続的な刺激感

- (2)5〜6日間使用しても症状がよくならない場合。

効能・効果 虫さされ、かゆみ、湿疹、皮膚炎、かぶれ、じんましん、あせも

用法・用量 1日数回、適量を患部に塗布してください

<用法・用量に関連する注意> (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください (2)目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください (3)本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください (4)定められた用法・用量を守ってください (5)薬剤塗布後の患部をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください

成分・分量 100g中

フレニソロン吉草酸エステル酢酸エステル(PVA)……………0.15g
ジェンヒドラン塩酸塩……………1.0g イソプロピルメチルフェノール……………0.1g
β-メントール……………3.5g dl-カンフル……………1.0g
添加物:クエン酸水和物、ヒドロキシプロピルセルロース、
ハアセチルシロ糖、エタノール、アジピン酸ジイソプロピル

副作用被害救済制度 0120-149-9331



第2類医薬品

鎮痒消炎剤

18g

RAKOOL

ラコピオンEXゲルα

しつこい

かゆみ・虫さされ・しつしんに

手を汚さず塗れる
直塗り
チューブ

優れた抗炎症
効果を持つ


PVA 配合

アンデドラッグ型ステロイド

清涼成分

かゆみ止め成分

殺菌成分



保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください
- (2)小児の手の届かない所に保管してください (3)他の容器に入れかえないでください (誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)火気に近づけないでください (5)メガネ、時計、アクセサリなどの金属類、化繊の衣類、プラスチック類、床や家具などの塗装面等に付着すると変質することがありますので、付着しないよう注意してください (6)使用期限(外箱及び容器に記載)を過ぎた製品は使用しないでください

発売元

ラクー薬品販売株式会社
東京都足立区鹿浜1丁目9番14号

製造販売元

東光薬品工業株式会社
東京都足立区新田2丁目16番23号

お問い合わせ先

0120-86-8998

製造
番号

使用
期限