

胃痛・胸やけに

第2類医薬品

胃腸鎮痛鎮痙薬

コランチル[®]A 顆粒 シオノギ製薬

コランチルA顆粒は、淡い甘味のある白色の顆粒剤で、すぐれた効き目の鎮痛鎮痙剤、制酸剤を含んでいます。



使用上の注意……

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故がおこりやすくなります)

1. 次の人は服用しないで下さい

透析療法を受けている人

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい

他の胃腸鎮痛鎮痙薬、ロートエキスを含有する他の胃腸薬、乗物酔い薬

3. 服用後、乗物または機械類の運転操作をしないで下さい

(目のかすみ、異常なまぶしさなどの症状があらわれることがあります)

4. 長期連用しないで下さい



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談下さい

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人
- (3) 授乳中の人
- (4) 高齢者
- (5) 薬などによりアレルギー症状をおこしたことがある人
- (6) 次の症状のある人
 - 排尿困難

(7) 次の診断を受けた人

心臓病、腎臓病、緑内障

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談下さい

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
精神神経系	頭痛
泌 尿 器	排尿困難
そ の 他	顔のほてり、異常なまぶしさ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談下さい

口のかわき、便秘、下痢、眠気、目のかすみ

4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談下さい

……効能・効果……

- 胃痛、腹痛、さしこみ（せんつう 疝痛・しゃく 癢）
○胃酸過多、胸やけ

……用法・用量……

次の量を食間におのみ下さい。（食間とは食後 2～3 時間を指します）

年 齢	1 回量	1 日服用回数
成人（15 才以上）	1 包	3 回
15 才未満	服用させないこと	

- 定められた用法・用量を厳守して下さい。

……成分・分量……


コランチルA顆粒は、白色の顆粒剤で、1 包（1 g）中に次の成分を含有しています。

成 分		含量（1包中）	はたらき
鎮痛鎮痙剤	ジサイクロミン塩酸塩	5mg	胃の神経と筋肉の両面に働いて、痙れんをしずめ痛みを止める
制酸剤	乾燥水酸化アルミニウムゲル	400mg	速効性（酸化マグネシウム）と持続性（水酸化アルミニウムゲル）の制酸剤を配合し、適切な胃内酸度を持続するので、胃酸過多による胸やけ、空腹時の痛みなどを改善する
	酸化マグネシウム	200mg	

添加物として ヒドロキシプロピルセルロース、白糖、トウモロコシデンプン、ステアリン酸、含水二酸化ケイ素を含有しています。

……保管および取扱い上の注意……

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない、涼しい所に保管して下さい。
(2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
(3) 他の容器に入れ替えないで下さい。
（誤用の原因になったり、品質が変化します）
(4) 使用期限をすぎた製品は、服用しないで下さい。



……お問い合わせ先……

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記までお願いいたします。
塩野義製薬株式会社「医薬情報センター」
電話：大阪 06-6209-6948，東京 03-3406-8450
受付時間：9 時～17 時（土、日、祝日を除く）

「副作用被害救済制度」について
（独）医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

®:登録商標

製造販売元
塩野義製薬株式会社
大阪市中央区道修町3丁目1番8号