

漢方製剤

第2類医薬品

レスフィーナ[®] 細粒「分包」

 シオノギ製薬

◇レスフィーナ細粒「分包」は、9種類の生薬からなる抑肝散加芍薬黄連水製乾燥エキスを配合した製剤です。

◇神経のたかぶりが強く、イライラする方の不眠症、神経症、更年期障害などに効果があります。



使用上の注意……

相談すること



- 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談下さい
 - 医師の治療を受けている人
 - 妊婦または妊娠していると思われる人
 - 胃腸の弱い人
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみなどをおこしたことがある人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談下さい

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部重圧感
その他	全身倦怠感、ふらつき

- 3.1ヵ月位（小児夜泣きに服用する場合には1週間位）服用しても症状がよくなる場合
合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談下さい

……効能・効果……[※]

体力中等度以上をめやすとして、神経のたかぶりが強く、怒りやすい、イライラなどがあるものの次の諸症：

神経症、不眠症、小児夜泣き、小児疳症（しんごうかんしんじょう神経過敏）、歯ぎしり、更年期障害、血の道症

〈効能・効果に関連する注意〉

血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動にもなって現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことです

……用法・用量……

次の量を食間におのみ下さい。（食間とは、食後2～3時間を指します）

年 齢	1 回量	1 日服用回数
成人（15才以上）	1 包（1.5g）	3 回
4才以上15才未満	1/2 包（0.75g）	
1才以上4才未満	1/4 包（0.375g）	
1才未満	服用させないこと	

- 定められた用法・用量を厳守して下さい。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

……成分・分量……

レスフィーナ細粒「分包」は、褐色の細粒で、3包（1.5g×3・成人1日量）中に次の成分を含有しています。

成分	含量(3包中)
抑肝散加芍薬黄連水製乾燥エキス	2700.0mg
（ブクリョウ……3433.2mg カンゾウ……316.8mg サイコ……1056.6mg センキュウ……1426.2mg ソウジュツ……2799.0mg チョウトウコウ……792.0mg トウキ……2905.2mg シャクヤク……2112.6mg オウレン……158.4mg より得たエキス	

添加物として白糖、セルロース、無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルセルロースを含有しています。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤には生薬が配合されているので、製品により色が多少異なることがあります

……保管および取扱い上の注意……

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない、涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 本品は吸湿しやすい製剤のため、開封後は速やかに服用して下さい。また、開封状態で置いておくと粒が変色することがあります。変色した場合は服用しないで下さい。
- (4) 他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり、品質が変化します）
- (5) 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用して下さい。
- (6) 使用期限をすぎた製品は、服用しないで下さい。



……お問い合わせ先……

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記までお願いいたします。
塩野義製薬株式会社「医薬情報センター」
電話：大阪 06 -6209 -6948、東京 03 -3406 -8450
受付時間：9時～17時（土、日、祝日を除く）

「副作用被害救済制度」について
(独)医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

®:登録商標

販売元

塩野義製薬株式会社

大阪市中央区道修町3丁目1番8号

製造販売元

日東薬品工業株式会社

京都府向日市上植野町南開 35-3