

ビタミンC 配合総合かぜ薬

第2類医薬品

パイロン® 溶かしてのむかぜ薬

シオノギ製薬

- ◇ お湯または水に溶かしてのむ服用しやすいレモン味のかぜ薬です。
- ◇ 解熱鎮痛剤のアセトアミノフェンをはじめ、くしゃみ・鼻みず・鼻づまりをおさえる抗ヒスタミン剤と2種類の鎮咳剤に加え、発熱で失われやすいビタミンCや、去痰作用のある生薬のカンゾウエキスを配合し、かぜの諸症状を緩和します。



使用上の注意……

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故がおこりやすくなります)

- 次の人は服用しないでください
(1) 本剤または本剤の成分によりアレルギー症状をおこしたことがある人
(2) 本剤または他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくをおこしたことがある人
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬など(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬など)
- 服用後、乗物または機械類の運転操作をしないでください(眠気などがあらわれることがあります)
- 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
- 服用前後は飲酒しないでください
- 長期連用しないでください



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください
(1) 医師または歯科医師の治療を受けている人
(2) 妊婦または妊娠していると思われる人
(3) 高齢者
(4) 薬などによりアレルギー症状をおこしたことがある人
(5) 次の症状のある人
高熱、排尿困難
(6) 次の診断を受けた人
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	め ま い
泌 尿 器	排 尿 困 難
そ の 他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状がおこることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁などがあらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がないなどが持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振などがあらわれる。
腎障害	発熱、発疹、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢などがあらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱などがみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しいなどがあらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿などがあらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛みなどがあらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください
便秘、口のかわき、眠気
4. 5～6 回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください


……効能・効果……

かぜの諸症状（悪寒、発熱、のどの痛み、せき、たん、鼻みず、鼻づまり、くしゃみ、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

……用法・用量……

1 包を約 100mL のお湯または水に溶かして、食後なるべく 30 分以内にのむください。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
成人（15 才以上）	1 包	3 回
15 才未満	服用させないこと	



- 定められた用法・用量を厳守してください。
- お湯を加えて服用する場合は、やけどをしないようにご注意ください。
- 冷水の場合は溶けにくいですが、よくかきまぜ分散させて、すぐにのむください。

……成分・分量……


パイロン 溶かしてのむかぜ薬は、褐色の散剤で、3 包（4g×3・成人 1 日量）中に次の成分を含有しています。

成 分	含量（3 包中）	はたらき
アセトアミノフェン	900mg	熱を下げ、痛みをおさえる
d- クロルフェニラミンマレイン酸塩	3.5mg	くしゃみ、鼻みず、鼻づまりをおさえる
ジヒドロコデインリン酸塩	24mg	せきをしずめる
dl- メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	せきをしずめ、たんの切れをよくする
無水カフェイン	75mg	痛みをおさえるはたらきを助けるほか、頭痛をやわらげる
アスコルビン酸（ビタミン C）	500mg	かぜのときに消耗しやすいビタミン C の補給
カンゾウ乾燥エキス （原生薬換算量 500mg）	70mg	たんの切れをよくする

添加物として アスパルテーム（L-フェニルアラニン化合物）、クエン酸、白糖、D-ソルビトール、ポビドン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、香料を含有しています。

……保管および取扱い上の注意……

- （1）直射日光の当たらない湿気の少ない、涼しい所に保管してください。
- （2）小児の手の届かない所に保管してください。
- （3）他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり、品質が変化します）
- （4）本剤は吸湿しやすい製剤です。1 包を開封後は速やかに服用してください。また、開封状態で置いておくと粒が変色することがあります。変色した場合は服用しないでください。
- （5）使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。



……かぜを早く治すために、次のことに心がけてください……

■安 静 ・無理な仕事や外出は避ける。 ・暖かくして十分な睡眠 	■保 温 ・着衣、室温・湿度に注意 ・熱のあるときは入浴は避ける。 	■栄養・ビタミン ・温かくカロリーの高い、消化しやすい食事 ・ビタミンの補給は抵抗力を高め、かぜの回復を早めます。 	■のどの保護 ・禁煙と室内の湿度を適度に。 ・外出後は必ずうがい。 
---	--	--	--

……お問い合わせ先……

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記までお願いいたします。
塩野義製薬株式会社「**医療情報センター**」
電話：大阪 06-6209-6948、東京 03-3406-8450
受付時間：9 時～17 時（土、日、祝日を除く）

「副作用被害救済制度」について
（独）医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

®：登録商標

販売元
塩野義製薬株式会社
大阪市中央区道修町 3 丁目 1 番 8 号

製造販売元
日東薬品工業株式会社
京都府向日市上植野町南開 35-3