

## 頭痛・発熱に

## 非ピリン系解熱鎮痛薬

第2類医薬品

## シオノギ製薬

## セデス・ファースト

セデス・ファーストは、胃を守る成分を含んだ速く効く解熱鎮痛薬です。服用のしやすいフィルムコーティングされた錠剤で、痛みや発熱にすぐれた効果をあらわします。眠くなる成分を含んでいません。



## 使用上の注意 ……

## してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故がおこりやすくなります)

## 1. 次の人は服用しないで下さい

- (1) 本剤または本剤の成分によりアレルギー症状をおこしたことがある人
- (2) 本剤または他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくをおこしたことがある人

## 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい

他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬

## 3. 服用前後は飲酒しないで下さい

## 4. 長期連用しないで下さい



## 相談すること

## 1. 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師または登録販売者にご相談下さい

- (1) 医師または歯科医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人
- (3) 水痘(水ぼうそう)もしくはインフルエンザにかかっている、またはその疑いのある小児(15才未満)
- (4) 高齢者
- (5) 薬などによりアレルギー症状をおこしたことがある人
- (6) 次の診断を受けた人

心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍

## 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談下さい

| 関係部位  | 症 状         | 関係部位  | 症 状     |
|-------|-------------|-------|---------|
| 皮 膚   | 発疹・発赤、かゆみ   | 精神神経系 | め ま い   |
| 消 化 器 | 吐き気・嘔吐、食欲不振 | そ の 他 | 過度の体温低下 |

まれに下記の重篤な症状がおこることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

| 症状の名称                                                        | 症 状                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ショック<br>(アナフィラキシー)                                           | 服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁などがあらわれる。                                |
| 皮膚粘膜眼症候群<br>(ステvens・ジョンソン症候群)、<br>中毒性表皮壊死融解症、<br>急性汎発性発疹性膿疱症 | 高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がないなどが持続したり、急激に悪化する。 |
| 肝機能障害                                                        | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振などがあらわれる。                                          |
| 腎障害                                                          | 発熱、発疹、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢などがあらわれる。                                                  |
| 間質性肺炎                                                        | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱などがみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。                         |
| ぜんそく                                                         | 息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しいなどがあらわれる。                                                          |

(裏面につづく)

3. 5～6 回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、  
歯科医師、薬剤師または登録販売者にご相談下さい

…… 効能・効果 ……

- 頭痛・歯痛・月経痛（生理痛）・神経痛・腰痛・外傷痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・  
関節痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛の鎮痛
- 悪寒・発熱時の解熱

…… 用法・用量 ……

次の量になるべく空腹時をさせて、水またはぬるま湯でおのみ下さい。  
また、おのみになる間隔は 4 時間以上おいて下さい。

|                  |          |           |
|------------------|----------|-----------|
| 年 齢              | 1 回量     | 1 日服用回数   |
| 成人（15 才以上）       | 2 錠      | 3 回を限度とする |
| 小児（7 才以上 15 才未満） | 1 錠      |           |
| 乳幼児（7 才未満）       | 服用させないこと |           |

- 定められた用法・用量を厳守して下さい。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

●錠剤の取り出し方

右図のように錠剤の入っている PTP シートの凸部を指先で強く押して  
裏面のアルミ箔を破り、取り出しておのみ下さい。（誤ってそのまま飲  
み込んだりすると、食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながる  
ことがあります）



…… 成分・分量 ……

セデス・ファーストは、白色のフィルムコーティング錠で、1 錠中に次の成分を含有しています。

| 成 分       | 含 量   | は た ら き                    |
|-----------|-------|----------------------------|
| エテンザミド    | 200mg | 熱を下げ、痛みをやわらげる              |
| アセトアミノフェン | 80mg  |                            |
| 無水カフェイン   | 40mg  | 痛みをおさえるはたらきを助けるほか、頭痛をやわらげる |
| 酸化マグネシウム  | 50mg  | 胃への負担をやわらげる                |

添加物として 乳糖水和物、カルメロースカルシウム、ヒドロキシプロピルセルロース、酸化チタン、クロ  
スカルメロースナトリウム、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、クエン酸トリエチルを含有して  
います。

…… 保管および取扱い上の注意 ……

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない、涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) PTP シートから出して他の容器に入れ替えないで下さい。  
（誤用の原因になったり、品質が変化します）
- (4) 使用期限をすぎた製品は、服用しないで下さい。



…… お問い合わせ先 ……

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記までお願いいたします。  
塩野義製薬株式会社「医薬情報センター」  
電話：大阪 06-6209-6948、東京 03-3406-8450  
受付時間：9 時～17 時（土、日、祝日を除く）

「副作用被害救済制度」について

（独）医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

®:登録商標

製造販売元

塩野義製薬株式会社

大阪市中央区道修町 3 丁目 1 番 8 号