

2012年3月改訂(記載要領変更に伴う改訂)
この添付文書は、
本剤とともに保管し、
服用の際には、よくお読みください。

第3類医薬品 赤ちゃんの便秘薬

和光堂 マルツエキス

赤ちゃんが便秘かどうかの目安は、便の硬さで見分けます。和光堂マルツエキスは、便が硬く排便が困難なときなどの便秘、又はその傾向にあるときに用います。麦芽糖を60%以上含んでおり、そのゆるやかな発酵作用により腸の蠕動(内容物を送り出す動き)を亢進し、適度な自然便にしますので、栄養を与えながら便通を整える、赤ちゃんに好ましい便秘薬です。

⚠(使用上の注意)

ⓧしてはいけないことⓧ

【守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります】

本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。

他の瀉下薬(下剤)

ⓧ相談することⓧ

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(1) 医師の治療を受けている乳幼児。

(2) 1カ月未満の乳児(新生児)。

(3) 次の症状のある乳幼児。はげしい腹痛、嘔吐

2. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。下痢

3. 1週間位服用しても症状がよくならない場合は、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

4. 便通不足は、母乳不足又は調整粉乳希釈方法の誤りにより起こることがありますので、このような場合には医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】


乳幼児の便秘、乳幼児の発育不良時の栄養補給

【用法・用量】

1歳未満の乳児には、授乳前に50~100mLの温湯かミルクに加え与えます。又、1歳以上3歳未満の幼児には、そのままか50~100mLの温湯に加え与えます。

年齢	1回量	服用回数
1歳以上3歳未満	9~15g	1日3回を 限度とする
6カ月以上1歳未満	6~9g	
6カ月未満	3~6g	

(1) 用法・用量をよく守ってください。(2) 保護者の指導監督のもとに服用させてください。(3) 添付のさじ1杯(平らに)は6g、内側の指示線4まで(水平に)は4g、3まで(水平に)は3gです。(4) さじは洗ってからお使いください。



【成分・分量】

マルツエキス100%

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない湿気のない涼しい所にフタをしっかりとめて保管してください。開缶後は3ヵ月以内に服用してください。
(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になり品質が変わります)。(4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

【お問い合わせ先】

和光堂株式会社 お客様相談室
東京都千代田区神田司町2-14-3
フリーダイヤル ☎ 0120-88-9283

受付時間: 9時から17時まで(土・日・祝日を除く)

製造販売元

和光堂株式会社

東京都千代田区神田司町2-14-3

212◎14