

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

販売名：オムニードIDプラスター3.75M

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は使用しないでください。
 - (1) 本剤による過敏症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
 - (2) ぜんそくを起こしたことがある人。
2. 次の部位には使用しないでください。
 - (1) 目の周囲、粘膜等。
 - (2) 湿疹、かぶれ、傷口。
 - (3) みずむし、たむし等又は化膿している患部。
3. 連続して2週間以上使用しないでください。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感、皮下出血

(2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合

【効能・効果】

腰痛、筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

【用法・用量】

ライナー(プラスチックフィルム)をはがし、1日2回を限度として患部に貼付してください。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 11歳未満の小児には使用させないでください。
- (3) 11歳以上15歳未満の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

- (4) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤であるので、症状がある場合だけ使用してください。
- (5) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭きとってから使用してください。
- (6) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (7) 皮膚の特に弱い人は、本剤を同じ箇所には続けて貼らないでください。

【成分・分量】 膏体100g(1m²)中

インドメタシン……………3.75g
 L-メントール……………3.0g
 添加物として、ステレン・イソプレン・ステレンブロック共重合体、ポリブテン、BHT、流動パラフィン、その他1成分を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 品質保持のため、開封後の未使用分はもとの袋に入れ、開口部を折り曲げ、きちんと閉めて保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
 なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。

製品についてのお問い合わせ先：帝國製薬株式会社 お客様相談室
 電 話 (0879) 25-2363
 受付時間 9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

発 売 元 ティコクファルマケア株式会社
 香川県東かがわ市三本松567番地
 製造販売元 帝國製薬株式会社
 香川県東かがわ市三本松567番地

