

特徴

- オムニードフェルビナクは、有効成分(フェルビナク)が痛みの原因物質の生成を抑え、痛みを鎮める鎮痛・消炎フェルビナクパッチ剤です。
- オムニードフェルビナクは、粘着性にすぐれた基材と伸縮性のある基布を使用していますので、ひじやひざにもピッタリフィットします。
- オムニードフェルビナクは、基剤中の水分により、打撲、捻挫等による熱をもった局部を心地よく冷却します。

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

オムニードフェルビナク

第2類医薬品

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は使用しないでください。

- 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
 - せんそくを起こしたことがある人。
 - 妊娠又は妊娠していると思われる人。
 - 15歳未満の小児。
2. 次の部位には使用しないでください。
- 目の周囲、粘膜等。
 - 腫瘍、かぶれ、傷口。
 - みずむし・たむし等又は化膿している部位。
3. 連続して2週間以上使用しないでください。

☒ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- 医師の治療を受けている人。
- 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

疾患部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、はれ、かゆみ、ヒリヒリ感、かぶれ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症 状 の 名 称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みと腫れ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

【用法・用量】

表面のライナーをはがし、1日2回を限度として患部に貼付してください。

●15歳未満の小児は使用しないでください。

〈用法・用量に留意する注意〉

- 用法・用量を厳守してください。
- 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用してください。
- 汗をかいり、皮膚がぬれているときは、よく拭き取ってから使用してください。
- 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2㎠角の小片を目標として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確認してから使用してください。

【成分・分量】

膏体 100g 中

フェルビナク……0.5g(1枚中 フェルビナク 70mg)

添加物として、ジメチルメタセチルアミン、カルボキシビニルポリマー、酢酸チタン、カオリイン、エトキシ乙酸Na、D-ソルビトール、プロピレンジコール、クロタミトム、ポリアクリル酸Na、ポリアクリル酸、グリセリン、pH調整剤、その他3成分を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。

2) 小児の手の届かない所に保管してください。

3) 他の容器に入れ替えないでください。また、未使用分はもとの袋に入れ、開封口のチャックをきちんと閉めて保管してください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)

4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても開封後はなるべく早く使用してください。

【包装】28枚入 [7枚×4袋] (1枚サイズ: 14cm×10cm)

発売元

テイコケファルマシア株式会社

香川県東かがわ市三本松567番地

製造販売元

帝國製薬株式会社

香川県東かがわ市三本松567番地

このまま押してください。

（お問い合わせ先）

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

帝國製薬株式会社 お客様相談室

電話 (0879) 25-2363

受付時間 9:00~17:00

(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

4 987373 071720