

服用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に、読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品



漢方製剤

モリ ハイツウン

(疎経活血湯エキス製剤)

特 徴

モリ ハイツウンは、疎経活血湯（そけいかっけつとう）という漢方薬のエキスを飲みやすい顆粒剤にしたものです。本剤は、ふだんお酒を飲み過ぎる人や、肉食過多の食生活をしている人などの血の流れの滞りをよくして神経痛、関節痛、腰痛、筋肉痛のある人のときにしびれを伴う痛みにも効果をあらわします。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

次の方は服用しないでください。
生後3ヵ月未満の乳児。



相談すること

- 次の方は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - 高齢者。
 - 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。
むくみ
 - 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 - 服用後、次の症状があらわれた場合
- 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

(2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

<用法及び用量に関連する注意>

- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

成分及び分量

本剤3包(1包4.0g)中に、次の生薬から抽出された疎経活血湯エキス5.6gが含まれています。

トウキ(当帰) ……………2g	ボウイ(防已) ……………1.5g
ジオウ(地黄) ……………2g	キョウカツ(羌活) ……………1.5g
ピャクジュツ(白朮) ……………2g	ハマボウフウ(浜防風) ……………1.5g
センキュウ(川芎) ……………2g	リュウタン(竜胆) ……………1.5g
トウニン(桃仁) ……………2g	ショウキョウ(生姜) ……………0.5g
ブクリョウ(茯苓) ……………2g	チンピ(陳皮) ……………1.5g
シャクヤク(芍薬) ……………2.5g	ピャクシ(白芷) ……………1g
ゴシツ(牛膝) ……………1.5g	カンゾウ(甘草) ……………1g
イレイセン(威霊仙) ……………1.5g	

添加物として、乳糖、トウモロコシデンプン、ステアリン酸マグネシウムを含有しています。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- 1包を分割して服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

効能又は効果

体力中等度で、痛みがあり、ときにしびれがあるものの次の諸症：
関節痛、神経痛、腰痛、筋肉痛

用法及び用量

次の量を食前または食間に、水またはお湯で服用してください。
(食間とは食後2～3時間を指します)

年 齢	1 回 量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1包	3 回
15歳未満7歳以上	$\frac{2}{3}$ 包	
7歳未満4歳以上	$\frac{1}{2}$ 包	
4歳未満2歳以上	$\frac{1}{3}$ 包	
2歳未満	$\frac{1}{4}$ 包	

●本剤は天然の生薬を原料として製造していますので、製品の色や味等に多少の差異が生じることがあります。効果には変わりありません。

本剤についてのお問い合わせ先

大杉製薬株式会社 お客様相談室
〒545-0002 大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2
電話(06)6629-0062
受付時間 10時から17時まで(土、日、祝日を除く)

大杉製薬株式会社

大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2