



(効能)すり傷、きり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒
 (有効成分75mL中)ベンゼトニウム塩化物75mg、アラントイン150mg
 添加物としてエデト酸Na、亜硫酸Na、クエン酸、クエン酸Na、ニコチン酸アミドを含有します。(用法・用量)1日数回患部に噴霧またはガーゼ、脱脂綿に浸して塗布してください。外用専用75mL

製造販売元 **MUHI** 株式会社 池田模範堂
 富山県中新川郡上市町神田16番地

☎076-472-0911

お客様相談窓口 (平日9:00~17:00)

第3類
 医薬品

使用上の注意

相談すること 1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。(1)医師の治療を受けている人。(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(3)患部が広範囲の人。(4)深い傷やひどいやけどの人。2.使用後、次の症状があらわれた場合は、副作用の可能性があるため、直ちに使用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。皮膚：発疹・発赤、かゆみ 3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

用法・用量に関連する注意(1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。使用開始目安年齢：生後3カ月以上(2)目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。(3)外用にのみ使用すること。**保管及び取扱い上の注意**(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。(2)小児の手のとどかない所に保管すること。(3)他の容器に入れかえないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4)使用期限(底面に西暦年と月を記載)をすぎた製品は使用しないこと。



外装フィルム
 ボトル
 キャップ

副作用救済制度
 ☎0120-149-931

®登録商標 AA10



4