

荒れ割れ肌、^{こな}粉ふき肌を修復！ 乾皮症、角化症の治療薬

リペアクト[®]クリーム

販売名：リペアクト

■乾燥肌・乾皮症と粉ふき肌

ひどい乾燥肌(乾皮症)になると肌細胞は元気を失い、正常な角層が作られにくくなる状態(角化異常)に陥ります。その結果、弾力のない古い角層がたまっていき、ひび割れが起きやすくなります。そのため、粉がふいたようになる「粉ふき肌」になったり、表面が浅くひび割れてめくれ上がる「荒れ割れ肌」になったりします。特にすねは皮脂の分泌量が少ないため乾燥肌が悪化しやすく、「粉ふき肌」になりやすい部位です。


■粉ふき肌⇄乾皮症の悪循環

「粉ふき肌」「荒れ割れ肌」になると見た目が悪いだけでなく、肌の水分を保つバリア機能が失われるので、より乾燥が進行し、肌細胞はますます元気を失い、角化異常をさらに悪化させてしまう悪循環に陥ります。一時的な保湿だけではこの悪循環は止まりません。角化機能を正常化して、乾燥に強い肌を作り出すことが大切です。

■リペアクトの特長

リペアクトは「粉ふき肌」「荒れ割れ肌」のようなひどい乾皮症を治療する医薬品です。「粉ふき肌」の肌症状を修復するとともに、弱った肌細胞に元気を与え、角化機能を正常化します。乾皮症の悪循環(角化異常)を止めることで、「粉ふき肌」の元に働き健康な状態にします。

＜粉ふき肌の元に働くトリプル処方＞



使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください

- (1)出血性血液疾患(血友病、血小板減少症、紫斑病など)の人。
- (2)わずかな出血でも重大な結果をきたすことが予想される人。
(血液凝固抑制作用を有し出血を助長するおそれがあります。)

2. 次の部位には使用しないでください

- (1)目や目の周囲、粘膜(口腔、鼻腔、膣など)。

相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)薬などによりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
- (3)湿潤やただれのひどい人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、紫斑

3. 5～6日間使用しても症状がよくなりえない場合は使用を中止し、この説明文書をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効 能

乾皮症、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、小児の乾燥性皮ふ、手指の荒れ、手足のひび・あかぎれ、しもやけ(ただれを除く)、きず・やけどのあとの皮ふのしこり・つっぱり(顔面を除く)、打身・ねんざ後のはれ・筋肉痛・関節痛

用法・用量

1日1～数回、適量を患部にすりこむか、又はガーゼなどにのばして貼ってください。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)目に入らないように注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合(充血や痛みが持続したり、涙が止まらない場合等)には、眼科医の診療を受けてください。
- (3)本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。
 - 出血のある傷口には使用しないでください。(血が止まりにくくなる場合があります。)
 - かさぶたには使用しないでください。
 - 顔面にある傷あと、やけどのあとには使用しないでください。

成分とそのはたらき

有効成分(100 g 中)

成 分	分 量	は た ら き
ヘパリン類似物質	0.3 g	保湿作用で、皮ふにうるおいを与えます。角化機能を正常にします。
パンテノール (プロビタミンB ₅)	1.0 g	肌細胞の正常なはたらきを助け、細胞に元気を与えます。
アラントイン	0.2 g	荒れたり、ひび割れた皮ふ組織の修復を助けます。
トコフェロール酢酸エステル	0.5 g	血行を促進し、患部の回復を早めます。

添加物としてエドト酸Na、カルボキシビニルポリマー、キサンタンガム、グリセリン、ステアリルアルコール、トリイソオクタン酸グリセリン、ワセリン、1,3-ブチレングリコール、ベヘニルアルコール、ベヘン酸、グリセリン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリオキシエチレンセチルエーテル、ステアリン酸ソルピタン、ジイソプロパノールアミン、パラベンを含有します。

本剤にステロイド成分は配合されていません

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限(ケース及びチューブに西暦年と月を記載)をすぎた製品は使用しないでください。
使用期限内であっても、品質保持の点から開封後はなるべく早く使用してください。
- (5)使いやすいうみネートチューブです。破れにくい特長がありますが、強く押すと中身が飛び出す場合があります。チューブ尻から順次軽く押し出すようにして使用してください。

お子さまが誤ってリペアクトを口にした場合

- ①まず、口の中の物をふき取ってあげてください。
- ②少しなめた程度では影響はありません。
- ③1時間ほど様子を見て、異常がある場合は、医師に診てもらってください。

お客様相談窓口：株式会社 池田模範堂 〒930-0394 富山県中新川郡上市町神田16番地
☎ 076-472-0911 (電話受付時間：月～金(祝日を除く) 9:00～17:00)