

ヤブ蚊・ダニなどによる  
はれ・赤みをともなう虫さされ・かゆみに

# ムヒアルファ<sup>®</sup>S,

販売名：ムヒアルファ S1

## この製品の特長

- ムヒアルファ S1は、「3つのαパワー」でかゆい皮ふ症状をしっかり治療します。ヤブ蚊・ダニなどによるはれ・赤みをともなう虫さされや、かぶれ・しつしんは、①かゆみ原因物質の放出、②炎症の発生、③かゆみ神経の興奮が原因で起こります。ムヒアルファ S1は、これらの原因に作用し、かゆい皮ふ症状を元からしっかり治療します。

**パワー1** かゆみ止め成分(ジフェンヒドラミン塩酸塩)が、かゆみ原因物質(ヒスタミン)のはたらきをブロックします。

**パワー2**

抗炎症成分(デキサメタゾン酢酸エステル)が、かゆみ、はれ・赤みの原因である「炎症」の元にしっかり効きます。



**パワー3**

スープとする清涼感成分(β-メントール、dl-カインフル)が、かゆみ感覚をすばやくしすめます。

## 3つのαパワーの模式図

- かぶれやしつしんにも効く、使用感の良いクリームです。
- 虫さされだけではなく、アレルギー性のかぶれやしつしんの治療にも適したクリームです。
- べたつかず白く残らない、サラッとしたクリームです。



## 使用上の注意

### してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- 次の部位には使用しないでください  
水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部。
- ステロイド成分を含んでいるため、同じ部位に長期連用しないでください(目安として顔面で2週間以内、その他の部位で4週間以内)  
特に、顔面の広範囲に続けて長く使用すると赤ら顔のようになることがあります。

### 相談すること



- 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください
  - 医師の治療を受けている人。
  - 本人又は家族がアレルギー体质の人。
  - 薬や化粧品等によりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
  - 患部が広範囲の人。
  - 湿潤やただれのひどい人。
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書をもって医師又は薬剤師に相談してください
  - 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ
患 部	みずむし・たむし等の白せん症、にきび、化膿症、持続的な刺激感

(2) 5~6日間使用しても症状がよくならない場合。

## 効能

虫さされ、かゆみ、しつしん、皮ふ炎、ただれ、かぶれ、じんましん、あせも、しもやけ

## 用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。

### ＜用法・用量に関連する注意＞

- (1)定められた用法・用量を守ってください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。なお、本剤の使用開始目安年齢は生後6ヶ月以上です。
- (3)目に入らないように注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合(充血や痛みが持続したり、涙が止まらない場合等)には、眼科医の診療を受けてください。
- (4)本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。

## 成分とそのはたらき

有効成分 (100g中)

成 分	分 量	は た ら き
ジフェンヒドラミン塩酸塩	1.0g	かゆみ原因物質のはたらきをブロックします。
デキサメタゾン酢酸エステル	25mg	かゆみ、はれ・赤みの原因である炎症の元に作用するステロイド性抗炎症成分です。
l-メントール	3.5g	清涼感を与え、かゆみ感覚をしずめます。
dl-カンフル	1.0g	清涼感を与え、かゆみ感覚をしずめます。
クロタミトン	5.0g	かゆみをしずめます。
グリチルレチン酸	0.2g	生薬由来成分で、かぶれなどの炎症をしずめます。
イソプロピルメチルフェノール	0.1g	殺菌作用があります。

添加物としてエデト酸Na、カルボキシビニルポリマー、ステアリルアルコール、トリイソオクタン酸グリセリン、1,3-ブチレングリコール、ポリソルベート60、ジイソプロパノールアミン、リン酸水素Naを含有します。

### ＜ムヒアルファS1に配合されているステロイド成分について＞

虫さされ、かゆみの治療には、かゆみをすみやかにしかもしつかりおさえ、かきこわし等による悪化を防ぐことが重要です。ステロイド成分は、虫さされ等によるアレルギー性の炎症をおさえますので、主にかゆみの長期化と悪化の回避に有効にはたらきます。特に、ヤブ蚊やダニ、ノミなどによるかゆみには、ステロイド成分が適しています。

ステロイド成分による副作用は、皮ふが薄い顔や首等にあらわれやすく、顔の場合は、お酒を飲んだ時のように赤ら顔になることがあります。これらは、主に長期継続使用した場合に発生します。ムヒアルファS1に配合されているデキサメタゾン酢酸エステルは、作用緩和なステロイド成分ですので、虫さされ等小さな患部に短期間使用する場合には副作用はほとんどありません。同じ部位に継続して使う場合は、顔には2週間以内、他の部位は4週間以内を目安にしてください。

早めに使って早めに治すことが、ステロイド成分配合剤の上手な使い方です。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (2)高温をさけ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限(ケース及びチューブに西暦年と月を記載)をすぎた製品は使用しないでください。  
使用期限内であっても、品質保持の点から開封後はなるべく早く使用してください。

## お手当のポイント

☆患部を清潔にしてから塗布してください。

☆赤くなつてはがれが大きい場合は、氷や水で冷やしてください。

☆患部をかきむしらないでください。かきむしると症状が悪化し、あとが残ることがあります。

早い対処で、かゆみや炎症をおさえることが大切です。

### お子さまが誤ってムヒアルファS1を口にした場合

- ①まず、口の中の物をふき取ってあげてください。
- ②少しなめた程度では影響はありません。ただし、たくさん口にすると眠気があらわれることがあります。
- ③1時間ほど様子をみて、呼吸などに異常がある場合は、医師に診てもらってください。

お客様相談窓口：株式会社 池田模範堂 〒930-0394 富山県中新川郡上市町神田16番地  
☎ 076-472-0911 (電話受付時間：月～金(祝日を除く) 9:00～17:00)

製造販売元

**muhi** 株式会社 池田模範堂  
富山県中新川郡上市町神田16番地

®登録商標