2012年3月改訂（記載要領変更に伴う改訂）

ご使用に際して，この添付文書を必ずお読みください。また，必要なときに読めるよう大切に保管してください。

かゆみを伴う乾燥肌治療薬

カユピタック®ローション20　KAYUPITAC LOTION20

第2類医薬品

特長

保湿成分の尿素20%に，かゆみ止め成分リドカイン（局所麻酔剤）・ジフェンヒドラミン（抗ヒスタミン剤）および血行を良くして皮ふの新陳代謝を高めるトコフェロール酢酸エステル（ビタミンE）を配合したローション剤で，かゆみを伴う乾燥性皮ふ治療薬です。

●尿素のはたらきで，カサカサ肌にうるおいを与え，しっとりなめらかな状態を保ちます。
●リドカイン，ジフェンヒドラミンがかゆみを止め，グリチルレチン酸が炎症をおさえます。
●乳液状で広範囲に塗りやすく,液だれしません。
●微香性なので，においが気になりません。

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

〔守らないと現在の症状が悪化したり，副作用が起こりやすくなります〕

1．次の人は使用しないでください。

（1）本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状（発疹・発赤，かゆみ，かぶれ等）を起こしたことがある人

2．次の部位には使用しないでください。

（1）目の周囲，粘膜等
（2）引っかき傷等のきずぐち，亀裂（ひび割れ）部位
（3）かさぶたの様に皮ふがはがれているところ
（4）炎症部位（ただれ・赤くはれているところ）

相談すること

1．次の人は使用前に医師，薬剤師又は登録販売者に相談してください。

（1）医師の治療を受けている人
（2）薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2．使用後，次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので，直ちに使用を中止し，この文書を持って医師，薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症　状
皮　ふ	発疹・発赤，かゆみ，刺激感（痛み，熱感，ぴりぴり感），はれ，かさぶたの様に皮ふがはがれる状態

3．2週間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し，この文書を持って医師，薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

かゆみを伴う乾燥性皮膚（老人・成人の乾皮症）

【用法・用量】 1日1～数回，適量を患部に塗布する。

用法・用量に関連する注意

（1）定められた用法・用量を守ってください。

（2）目に入らないよう注意してください。万一，目に入った場合には，すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお，症状が重い場合には，眼科医の診療を受けてください。

（3）小児（15 歳未満）には使用させないでください。

（4）外用にのみ使用してください。

（5）化粧品ではないので，効能・効果で定められた患部のみに使用し，基礎化粧等の目的で顔面には使用しないでください。

【成分・分量】

1g 中

成　分	含　量	は　た　ら　き
尿　素	200㎎	保湿成分。カサカサ肌に水分をとりこみ，しっとりやわらかくします。
リ　ド　カ　イ　ン	20㎎	かゆみの刺激が伝わるのをブロックすることで，かゆみをおさえます。
ジフェンヒドラミン	10㎎	抗ヒスタミン作用により，かゆみをおさえます。
グリチルレチン酸	3㎎	皮ふの炎症をおさえます。
トコフェロール酢酸エステル	5㎎	血行を良くして皮ふの新陳代謝を高めます。

添加物としてミリスチン酸イソプロピル，ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油，l-メントール，カルボキシビニルポリマー，グリセリン，ゲラニオール変性アルコール（99vol%），水酸化ナトリウム，スクワラン，白色ワセリン，その他3成分を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

（1）本剤のついた手で，目など粘膜に触れないでください。

（2）直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。

（3）小児の手のとどかない所に保管してください。

（4）他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります）

（5）使用期限（外箱及び容器に記載）をすぎた製品は使用しないでください。なお，使用期限内であっても，開封後は品質保持の点からなるべく早く使用してください。

【包　装】

１００g

本商品についてのお問い合わせは，お買い求めの薬局・薬店，又は下記の当社「お客様相談窓口」までお願い申し上げます。

祐徳薬品工業株式会社　　お客様相談窓口
電話：0954-63-1320
受付時間 9:00～17:00（土，日，祝日は除く）

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.htm
0120-149-931

製造販売元　**祐徳薬品工業株式会社**
佐賀県鹿島市大字納富分 2596 番地１