

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

歯肉炎・歯槽膿漏薬

医薬品

パラデントエース

第3類医薬品

【特徴】

パラデントエースは、ヒノキチオールを主成分とする歯肉炎・歯槽膿漏薬です。

その効果は…

- 歯グキからの出血をとめます。
- 口臭をなくします。
- 歯グキの発赤、はれをおさえます。
- 歯グキをひきしめ、血行を増進させます。

ご家庭でのお手当てにパラデントエースのご使用をおすすめします。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. しばらく使用しても症状がよくなりえない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能

歯齦炎、口内炎、舌炎、口唇炎、智歯周囲炎および歯槽膿漏の予防ならびに治療。

用法・用量

- 適量(1回0.2~0.5g、約1cm)を清潔な指頭または歯ブラシなどにとり、1日数回歯グキあるいは患部に塗布、またはマッサージしてください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 歯科用にのみ使用してください。

成分

成分	含量	はたらき
ヒノキチオール	0.1%	組織収斂作用により、歯グキのはれ、出血をおさえます。 抗菌作用により、歯周疾患の原因となる細菌の増殖をおさえます。

添加物として、カルボキシビニルポリマー、グリセリン、水酸化Na、ステアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン、ステアリン酸ソルビタン、流動パラフィン、サッカリンNa、エドト酸Ca/2Na、フェノール、香料、*l*-メントール、エタノール、赤色3号を含む。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

歯槽膿漏は、はっきりした自覚症状が少ないため、自分では気づかないうちに症状が進みます。そして、そのままほうっておくと歯グキが退縮し、そして最後には大切な歯が抜けてしまう結果となります。

しかし、歯槽膿漏は手当ての時期が早いほど、治癒率の高い病気でもあります。

●歯グキがはれている。

●歯をみがいた時や硬いものを食べると出血しやすい。

●水やお湯がしみる、ものをかむ時に痛みを感じる。

●ウミが出て口臭が強い。

こんな症状に気づいたらパラデントエースで早めに手当てをしてください。

〔歯槽膿漏の進行状況〕



- 歯をみがいた時や硬いものを食べた時に出血しやすい
- 歯肉の色が不自然に赤くなる




- 歯グキがはれる
- 口がくさい



- ウミが出て口臭が強い
- 歯肉の色が暗赤色になる
- 歯の動揺を感じる



- 歯グキが退縮し、歯根が露出する(水や湯がしみ、かむ時に痛みを感じる)
- 歯がグラグラする



- 最後には歯が抜けてしまう

ライオン株式会社
〒130-8644 東京都墨田区本所1-3-7

お問合せ先
お買い求めのお店又は下記にお問合せください
ライオン株式会社 お客様センター

0120-813-752

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

歯科医院で定期的に歯石をとって歯グキを大切にしましょう。